

# Vaccinazioni e Gravidanza



Le vaccinazioni contribuiscono a rendere più sicura la gravidanza e a proteggere il bambino

I vaccini sono gratuiti per le donne in età fertile e in gravidanza



## PRIMA

### \* MORBILLO-PAROTITE-ROSOLIA E VARICELLA

Prima della gravidanza assicurati di essere già stata vaccinata contro morbillo, parotite, rosolia e varicella, o di avere già avuto le malattie.

Queste malattie possono creare problemi anche gravi alla mamma e al neonato, se contratte in gravidanza.

Il ciclo vaccinale (due dosi) va completato almeno un mese prima di restare incinta.



## DURANTE

### \* DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE

Raccomandata nel 3° trimestre di gravidanza, protegge da tetano e difterite, ma in particolare dalla pertosse, una malattia molto grave nei primi mesi di vita del bambino.

Oltre a proteggere la mamma consente la trasmissione di anticorpi al bambino prima della nascita.

### \* INFLUENZA

La vaccinazione antinfluenzale viene eseguita durante tutta la gravidanza.

L'influenza aumenta il rischio di ospedalizzazione materna, prematurità, parto cesareo, sofferenza fetale, basso peso del nascituro e interruzione di gravidanza.



## DOPO

### \* MORBILLO-PAROTITE-ROSOLIA E VARICELLA

Se le vaccinazioni non sono state eseguite prima della gravidanza e non si sono avute le malattie, si raccomanda di vaccinarsi subito dopo il parto. Queste vaccinazioni possono essere eseguite anche durante l'allattamento.

### \* DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE

Se non è stata eseguita durante la gravidanza, può essere fatta dopo il parto, anche se il suo effetto protettivo sul neonato è molto minore e sarebbe opportuna la vaccinazione dei familiari e persone frequentate abitualmente.



Maggiori info  
[salute.regione.emilia-romagna.it](http://salute.regione.emilia-romagna.it)