

## GASTROSCOPIA

### 胃镜检查

#### 做胃镜检查的正确说明

为能正确地进行胃镜检查，请仔细地遵照以下的说明。

**如果在上午做胃镜检查：**必需在胃镜检查前 8 至 10 小时开始禁食。至检查前 3 小时可饮用茶、水。

**如在下午做胃镜检查（下午 2 点以后）：**可在上午 8 时以前吃清淡的早餐：茶、麦茶、菊花茶、果汁（不含咖啡或奶类饮品）和吃几片面包干或饼干。

#### 为了安全地做这项检查，必需做些什么？

- 如在服用抗血小板药（TERAPIA ANTIAGGREGANTE）和抗凝血药（TERAPIA ANTICOAGULANTE）做治疗，请通知胃镜检查员；
- 如正在服用抗血小板药(TERAPIA ANTIAGGREGANTE)而准备做活检、息肉或其他手术，应咨询家庭医生是否需要至少在检查前 7 日停止服药；
- 服用抗凝血药（TERAPIA ANTICOAGULANTE）的患者，应与个人的家庭医生或联系平时看诊的凝血中心，以咨询暂停疗程的方式，并在检查前一日做凝血酶原时间检验；
- 在检查当天不要服用抗酸或硫糖铝药物（如 MALOX），但不需停止服用其他平时服用的药物；
- 如有过敏和/或心脏呼吸器官或其他种类的病，请通知检查员；
- 育龄妇女应预先告知怀孕或可能有孕；
- 对于有严重心脏瓣膜、抗张型心肌病或人工机械瓣膜携带者，应注意与个人家庭医生协商做抗生素预防措施。

#### 应携带哪些药物？

- 停止服用的凝血药（TERAPIA ANTICOAGULANTE）的患者，携带前一日做的凝血酶原时间检验报告；
- 其他以前的检查报告：验血报告、食道胃镜、X 光片、专家诊断报告或特别与结肠镜有关的出院信；
- 平时常服用的药品包装和/或列表；
- 检查付款的收据（如应付款）。

如有用**镇定剂**，在检查后 12 小时内禁忌驾车和做需快速反应的活动。因此**病人必需有人陪同**。

病人在检查前将从检查员处获取一份有关胃镜的信息并**签署一份同意书**。