

L'AIDS E L'INFEZIONE DA HIV

Sintesi

- Dal 1985 al 2001 sono stati notificati 565 casi di AIDS tra i residenti in provincia di Modena, di cui 22 nel 2001.
- In provincia di Modena, dal 1996 il numero di decessi è calato più rapidamente rispetto al numero di nuovi casi, con un conseguente aumento del numero di persone con AIDS.
- Si assiste ad un progressivo cambiamento della modalità di trasmissione: in calo quella classica legata allo scambio di siringhe tra tossicodipendenti, in aumento quella eterosessuale.
- I cittadini provenienti da paesi extra Unione Europea rappresentano circa il 30% dei nuovi casi (biennio 2000-2001).

Dal 1982 al 2001 sono stati notificati, in Italia, al Centro Operativo AIDS (COA) dell'Istituto Superiore di Sanità, 49.333 casi cumulativi di AIDS. In Emilia-Romagna, nello stesso periodo, sono stati segnalati 4803 casi cumulativi, ciò pone la nostra regione al terzo posto dopo la Lombardia e il Lazio.

In provincia di Modena dal 1985 al 2001 sono stati notificati 565 casi di AIDS tra i residenti, di cui 22 nuovi casi (incidenza) nel 2001¹. Le notifiche totali effettuate in provincia di Modena indipendentemente dalla residenza dei casi sono state 596. Al 31.12.2001 in provincia di Modena vi erano 179 persone con AIDS (prevalenza). L'andamento temporale dei decessi e dei casi di AIDS mostra che in provincia di Modena, così come nel resto della regione, a partire dal 1996 il numero di decessi cala più rapidamente rispetto al numero di nuovi casi; questo determina un aumento del numero di persone con AIDS. Tale riduzione di mortalità e morbosità, nonché l'aumento del periodo di latenza clinica, devono essere messi in relazione con l'introduzione delle nuove terapie antiretrovirali che hanno dimostrato una indubbia efficacia terapeutica.


Per descrivere tempestivamente i cambiamenti in atto nell'epidemia dell'infezione da HIV è opportuno ricorrere alla segnalazione dei nuovi casi di infezione (sieropositività). L'Osservatorio Epidemiologico provinciale cerca di raggiungere tale obiettivo. Nel periodo che va dal 1985 al 31.12.2001, l'Osservatorio ha raccolto 1.572 notifiche di persone residenti nella provincia di Modena ed ha descritto l'evoluzione della composizione percentuale dei nuovi casi in base al fattore di rischio dichiarato. Se l'epidemia all'inizio della sua manifestazione è stata trasmessa dal gruppo dei tossicodipendenti, oggi si diffonde soprattutto attraverso la trasmissione eterosessuale. Nel triennio 1999-2001, infatti, la percentuale media di persone che hanno contratto l'infezione tramite rapporti eterosessuali è stata del 62% (15% tramite rapporti omosessuali e 13% per tossicodipendenza). Da segnalare l'aumento dell'età in cui viene diagnosticata l'infezione. Si è passati, infatti, da un'età mediana di 23 anni nel 1985 a 35 nel 2001 (39 per gli uomini e 33 per le donne).

Sta inoltre progressivamente aumentando il contributo di soggetti provenienti da Paesi extraeuropei sul totale dei nuovi casi di sieropositivi (circa il 30% nel biennio 2000-01); questo è in relazione ai flussi migratori che hanno interessato la provincia di Modena negli ultimi 10 anni con popolazioni provenienti anche da aree ad alta endemia per l'infezione da HIV.


La distribuzione dell'infezione nel territorio provinciale è abbastanza omogenea, ad eccezione del distretto di Modena (dove è registrata l'incidenza più alta).

¹ I dati relativi al 2001 sono da considerare provvisori sottostimando il fenomeno a causa del ritardo di notifica.


Casi di AIDS prevalenti (totale casi viventi) e incidenti (nuovi casi) residenti nella regione Emilia-Romagna dal 1984 al 2001.




Numero di nuovi casi (notifiche) e di decessi per AIDS nei residenti in provincia di Modena (anni 1986-2001).




Nuovi casi di infezione da HIV in provincia di Modena. Anni 1985-2001.



Tasso grezzo di incidenza cumulativo dell'AIDS nelle province della regione Emilia-Romagna. Anno 2000.



Tasso grezzo (x 100.000) dei nuovi casi di infezione da HIV nei distretti della provincia di Modena. Anni 1997-2001.



Distribuzione percentuale per fattore di rischio delle notifiche di HIV dei residenti in provincia dei Modena. Anni 1999- 2001.

