

LE MALATTIE INFETTIVE

Sintesi

- Tubercolosi: una tendenza temporale ascendente con tassi più elevati di quelli regionali e nazionali.
- Epatiti: tendenza temporale con oscillazioni per la forma A; leggermente in aumento quella della forma B; stabile la tendenza della nonA-nonB.
- Malaria: tendenza in crescita, con valori superiori a quelli nazionali.
- Salmonellosi: tendenze temporali stabili, allineate a quelle regionali.

In questa scheda è riassunta l'incidenza delle malattie infettive di maggior importanza: in questo caso viene registrata non la mortalità da esse causata, ma solo il numero di casi notificati dalle diverse figure mediche.

Dal punto di vista statistico le malattie più frequenti sono le classiche malattie infantili a trasmissione aerea: varicella, parotite e scarlattina che, pur con evidenti oscillazioni annuali, fanno registrare una media annuale rispettivamente di 1700, 800 e 250 casi all'anno. Interessante risulta anche la notevole contrazione del morbillo che, a seguito delle campagne vaccinali degli ultimi anni, è praticamente scomparso. Le patologie infettive che viceversa determinano un maggior impatto sanitario e sociale sono la tubercolosi, la salmonellosi, la malaria e le diverse forme di epatite virale.


La tubercolosi si distingue per una tendenza temporale chiaramente ascendente che risulta più spiccato nella nostra provincia se si confrontano i tassi modenesi con i tassi regionali e nazionali. I motivi che sono alla base di questo aumento sono essenzialmente tre: una maggior attenzione da parte dei clinici alla ricerca dei casi di Tbc, anche dovuto alle migliorate tecniche diagnostiche; un incremento significativo degli ammalati legati al fenomeno dell'immigrazione ed infine un piccolo apporto per i casi correlati alla diffusione dell'AIDS. La distribuzione in ambito provinciale di questa importante patologia infettiva non sembra causata da differenze di popolazione, ma piuttosto dai diversi livelli diagnostici utilizzati e risulta in ogni caso maggiormente incentrata nei distretti di pianura e nell'area modenese rispetto alle zone collinare e montana.

Per quanto riguarda le epatiti virali bisogna distinguere le tre forme principali: A, B e nAnB. Nella forma A, che ha come modalità di trasmissione la via alimentare (fecale-orale), si notano a livello provinciale forti variazioni dei dati con una punta relativa al 1997, che è stato anno epidemico anche nel resto d'Italia; i tassi rimangono comunque conformi ai valori regionali e costantemente inferiori ai dati nazionali. L'epatite B registra tassi in leggero aumento, allineati in pratica con gli indici regionali, che risultano anch'essi in controtendenza con i valori nazionali sempre in diminuzione negli ultimi anni. L'epatite nAnB fa segnare valori stabili praticamente coincidenti con tassi emiliani ed italiani.


La malaria infine dimostra un andamento costantemente in crescita che va sempre più distaccandosi dai tassi dell'intera collettività nazionale

La salmonellosi invece registra una tendenza temporale sostanzialmente stabile con tassi su 100.000 abitanti del tutto paragonabili a quelli dell'Emilia Romagna o dell'intera Italia. La distribuzione provinciale risente in modo peculiare della presenza o meno di importanti focolai epidemici di comunità: strutture protette, scuole, mense o ristoranti. Le classi di età più colpite risultano essere quelle infantili.


Tubercolosi, tassi di incidenza (x 100.000) in provincia di Modena. Anni 1995-99.



Tubercolosi, tassi medi di incidenza (x 100.000) in provincia di Modena per distretto. Anni 1995-99.




Epatite virale A, B e nAnB, tassi di incidenza (x 100.000) in provincia di Modena. Anni 1995-99.



Epatite virale A, B e nAnB, tassi di incidenza (x 100.000) in provincia di Modena, regione E-R e Italia. Anni 1995-99.

EPATITI VIRALI: Tassi 100.000					
Epatite A	1995	1996	1997	1998	1999
Modena	2,46	3,74	6,02	4,84	1,44
Rer	2,25	4,31	5,48	4,23	
Italia	2,56	15,45	17,77	5,29	
Epatite B	1995	1996	1997	1998	1999
Modena	3,11	3,91	2,76	5,16	4,80
Rer	3,62	3,82	4,65	4,48	
Italia	4,64	4,01	3,56	3,21	
Epatite NANB	1995	1996	1997	1998	1999
Modena	1,64	2,28	1,46	1,45	1,76
Rer	2,01	2,13	1,45	1,45	
Italia	2,61	2,05	1,66	1,51	

Malaria, tassi di incidenza (x 100.000) in provincia di Modena. Anni 1995-99.



Salmonellosi, tassi di incidenza (x 100.000) in provincia di Modena. Anni 1995-99.

