

# I TUMORI DEL COLON E DEL RETTO

## Sintesi


- E' la terza neoplasia per frequenza di incidenza e la seconda per mortalità.
- La tendenza temporale dei tassi standardizzati di incidenza del tumore del retto è in leggero calo, in aumento quella del colon negli uomini. La tendenza temporale dei tassi standardizzati di mortalità del tumore del colon è oscillante, con un calo negli uomini ed un leggero aumento nelle donne, quella del retto è in lieve riduzione negli uomini e stabile nelle donne.
- La sopravvivenza globale è meno del 50%; è inferiore al 40% per il tumore del retto femminile.
- L'incidenza standardizzata riportata dai Registri Tumori di Modena è simile al valore medio dei Registri Tumori italiani per le donne, leggermente inferiore per gli uomini.

In provincia di Modena ammalano ogni anno di tumore maligno del colon circa 300 persone e di tumore maligno del retto poco più di 120. Globalmente considerate, le neoplasie del colon-retto sono al terzo posto per frequenza d'insorgenza nella popolazione totale di uomini e donne assieme, dopo i tumori del polmone e della mammella. La tendenza dei nuovi casi (incidenza) del tumore del colon nel periodo 1988-97 è in aumento; quella del tumore del retto è oscillante. Osservando la tendenza temporale dei tassi standardizzati, per annullare l'effetto dell'età, si nota che nello stesso periodo l'incidenza standardizzata del tumore del colon aumenta negli uomini ed ha un andamento altalenante nella donne; per il tumore del retto, essa tende a diminuire in entrambi i sessi. In provincia di Modena, inoltre, l'incidenza del tumore del colon-retto è simile a quella del valore medio dei Registri Tumori italiani nelle donne e leggermente inferiore negli uomini.


La sopravvivenza per queste neoplasie in provincia di Modena è complessivamente buona rispetto alle altre province italiane in cui ha sede il Registro Tumori; tuttavia globalmente meno del 50% delle persone ammalate sopravvive a 5 anni; in particolare nelle donne con tumore del retto la sopravvivenza a 5 anni è inferiore al 40%.

Analizzando la mortalità, si nota che negli ultimi anni le neoplasie del colon-retto hanno provocato circa 210 morti all'anno, risultando al secondo posto (dopo il tumore del polmone) tra tutti i tumori per numero di decessi causati in provincia di Modena. La tendenza della mortalità nel periodo 1987-99 mostra un leggero aumento del numero di decessi per tumori del colon-retto globalmente considerati. Quando si riduce l'effetto dell'invecchiamento della popolazione mediante la tecnica della standardizzazione, si nota che la tendenza temporale della mortalità per le neoplasie del colon è oscillante con una leggera riduzione negli uomini ed un leggero aumento nelle donne; per le neoplasie del retto essa è in lieve riduzione per gli uomini e pressoché stabile nelle donne. Analizzando la mortalità per tumore del colon per aree si osserva che essa tende ad essere leggermente più elevata nel distretto di Carpi negli uomini e in quello di Modena nelle donne, mentre è ridotta nel distretto di Pavullo nelle donne. Per il tumore del retto la mortalità tende ad essere più elevata nei distretti di Modena e Vignola per gli uomini e Castelfranco per le donne.


**Incidenza delle neoplasie maligne del colon-retto in Italia. Tassi Standardizzati per 100.000 (standard Italia '81). Anni 1988-92. Fonte Eurocare 2.**




**Incidenza dei tumori del colon e del retto in provincia di Modena. Tassi Standardizzati per 100.000 (st. Italia '91). Anni 1988-97. Fonte: Registro Tumori di Modena**



**Sopravvivenza % in Italia a 5 anni dalla diagnosi. Tumori del colon e del retto incidenti nel periodo 1985-89. Fonte Eurocare**



**Mortalità per tumori del colon e del retto in provincia di Modena per comune di residenza. Tassi standardizzati per 100.000. Anni 1987-99.**



**Mortalità per tumori del colon e del retto in provincia di Modena. Tassi Standardizzati per 100.000 (st. Italia '91). Anni 1987-99. Fonte: Registro Tumori di Modena**

