

| | | |
|--|--|-----------------|
|  SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria | Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro | Rev. 2 |
| | ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_ | Data 14/04/2020 |
| | | Pagina 1 di 9 |

REVISIONI

| Rev. | Data | Pagine Modificate | Tipo – natura della modifica |
|------|--------------------------------|-------------------|--|
| 0 | 27/02/2020 | | Prot. AUSL n. 16043/20 del 27/02/2020 (lettera DS) |
| 1 | 09/03/2020 | tutte | Prot. AUSL n. 18855/20 del 09/03/2020 (lettera DS) |
| 2 | Data riportata in intestazione | tutte | Aggiornamento assegnazione dei DPI/DM |

| | | |
|---|--|-----------------|
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p>Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria</p> | Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro | Rev. 2 |
| | ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_ | Data 14/04/2020 |
| | | Pagina 2 di 9 |

| INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE e DISPOSITIVI BARRIERA | |
|--|--|
| Descrizione attività | Identificazione DPI/DM |
| IN TUTTI I CONTESTI ASSISTENZIALI | Mascherina chirurgica a tutti i pazienti, visitatori e caregiver, se tollerata ed igiene delle mani. Mascherina chirurgica durante l'assistenza di tutti i pazienti durante tutto il turno lavorativo in aggiunta agli altri dispositivi previsti per l'ordinario svolgimento dell'attività, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomi respiratori e fatto salvo le indicazioni sotto riportate. |
| IN TUTTI I CONTESTI LAVORATIVI NON ASSISTENZIALI (SANITARI E NON) Es. Aree amministrative, uffici, studi medici, call centre, front office,... | Mascherina chirurgica durante l'ordinario svolgimento dell'attività qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt o non siano presenti barriere fisiche di separazione. Arieggiare frequentemente i locali. |
| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LIVELLO BASE | |
| ASSISTENZA AL PAZIENTE CON FEBBRE E/O SINTOMI RESPIRATORI IN ASSENZA DI CONTATTO DIRETTO (ad esempio durante l'anamnesi, indagine epidemiologica, colloquio psichiatrico, filtro-triage,...) unitamente al camice/divisa personale, mantenendo una distanza col paziente di almeno un metro. | <ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata) - Mascherina chirurgica per l'operatore sanitario <p>Il personale sanitario deve indossare i dispositivi di protezione individuale di LIVELLO 1 qualora il paziente non possa indossare la mascherina chirurgica.</p> |
| PER L'ASSISTENZA AI CONTATTI DI CASI ACCERTATI (PAZIENTI ASINTOMATICI) <i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata) - Mascherina chirurgica per l'operatore sanitario - Sovracamice TNT - Guanti in nitrile non sterili monouso per l'operatore <p><i>Qualora il paziente non possa indossare la mascherina chirurgica il personale sanitario deve indossare anche gli occhiali protettivi o lo schermo facciale in aggiunta a quanto sopra.</i></p> |

| | | |
|---|--|-----------------|
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p>Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria</p> | Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro | Rev. 2 |
| | ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA | Data 14/04/2020 |
| | RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_ | Pagina 3 di 9 |

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LIVELLO 1

ASSISTENZA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE NON DIFFERIBILI AI CASI SOSPETTI / ACCERTATI DI COVID-19*

(ad esempio visita, contatto con il paziente per l'esecuzione di esami diagnostici, fisioterapia,...)

**Contesti organizzativi ove non vi sia una elevata concentrazione di pazienti COVID-19 e non si eseguono procedure che generano aerosol.*

Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.

- Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata)
- Copricapo monouso
- Mascherina chirurgica per operatore sanitario²
- Sovracamicie idrorepellente TNT a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile
- Occhiali protettivi o schermo faccialeⁱ o mascherina con visiera integrata
- Sovrascarpe¹
- Doppi guanti in nitrile non sterili monouso

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LIVELLO AVANZATO

ASSISTENZA DI CASI SOSPETTI/ACCERTATI DI COVID-19 **

***Contesti ove vi sia una elevata concentrazione di pazienti COVID-19 e/o quando si eseguono procedure che generano aerosol (REPARTI E AREE COVID-19, PMA, Ambulatori).*

Tra le misure organizzative prevedere l'identificazione e la separazione, anche tramite segnaletica a terra, tra aree contaminate ed aree non contaminate, atte ad evitare l'utilizzo promiscuo delle aree stesse.

Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.

PERSONALE CHE SVOLGE L'ASSISTENZA

- Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata)
- Copricapo monouso
- Facciale filtrante FFP2 / FFP3³
- Sovracamicie idrorepellente TNT a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile
- Sovrascarpe¹
- Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera
- Doppi guanti in nitrile non sterili monouso

PERSONALE CHE SUPPORTA L'ASSISTENZA E/O CHE OPERA NELLE AREE NON CONTAMINATE

- Mascherina chirurgica o facciale filtrante FFP2⁴
- Sovracamicie TNT

| | | |
|---|--|-----------------|
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p>Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria</p> | Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro | Rev. 2 |
| | ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_ | Data 14/04/2020 |
| | | Pagina 4 di 9 |

| | |
|---|---|
| <p>ESECUZIONE DEL TAMPONE OROFARINGEO E RINOFARINGEO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE, A DOMICILIO O IN ALTRO LUOGO</p> <p>PROCEDURE CHE GENERANO AEROSOL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedi Elenco in NOTA 6: su tutti i pazienti. - PROCEDURE ODONTOIATRICHE, PROCEDURE ENDOSCOPICHE CHE INTERESSANO LE VIE DIGESTIVE, PROCEDURE ORL CHE INTERESSANO LE VIE AEREE: su tutti i pazienti. <p><i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti. Le procedure odontoiatriche, endoscopiche, ORL non urgenti devono essere differite.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Copricapo monouso - Facciale filtrante FFP2 / FFP3 - Sovracamice idrorepellente TNT a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile - Sovrascarpe o calzari a gambale - Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera - Doppi guanti in nitrile non sterili monouso |
| <p>118 PER TRASPORTO DI CASO SOSPETTO / ACCERTATO DI COVID-19 O PAZIENTE CON SINTOMI RESPIRATORI</p> <p><i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata) - Copricapo monouso (in associazione al sovracamice) - Facciale filtrante FFP2 / FFP3 - Sovracamice idrorepellente TNT a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile/Tuta integrale protettiva idrorepellente solo per il 118 - Calzari a gambale (in associazione al sovracamice o alla tuta se priva di calzari incorporati) - Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera - Doppi guanti in nitrile non sterili monouso <p><i>Si raccomanda l'utilizzo della tuta integrale protettiva da parte di personale adeguatamente formato ed addestrato.</i></p> |

| | | |
|--|--|-----------------|
|  SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria | Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro | Rev. 2 |
| | ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_ | Data 14/04/2020 |
| | | Pagina 5 di 9 |

| INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE e DISPOSITIVI BARRIERA IN CONTESTI SPECIFICI E PARTICOLARI | |
|--|--|
| Descrizione | Identificazione DPI/DM |
| ATTIVITA' CHIRURGICA E TRAVAGLIO PARTO | |
| INTERVENTI CHIRURGICI NON DIFFERIBILI A TUTTI I PAZIENTI <i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Copricapo monouso - Facciale filtrante FFP2 / FFP3 - Sovracamice idrorepellente TNT a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile - Sovrascarpe¹ - Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera - Doppi guanti in nitrile non sterili monouso |
| SPDC | |
| ASSISTENZA A PAZIENTI PSICHIATRICI ASINTOMATICI | <ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata) - Mascherina chirurgica per l'operatore sanitario - Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera - Doppi guanti in nitrile non sterili monouso |
| LABORATORI (Microbiologia e Tossicologia) | |
| Le attività presso il laboratorio di microbiologia devono essere condotte sotto cappa a flusso laminare di classe 2 con vetro abbassato. | Mascherina chirurgica o facciale filtrante FFP2 in aggiunta agli altri dispositivi di protezione previsti dall'ordinario svolgimento delle attività. |
| Attività presso il laboratorio di tossicologia per la determinazione di anticorpi CoV2 IgG e IgM. | Facciale filtrante FFP2 in aggiunta agli altri dispositivi di protezione previsti dall'ordinario svolgimento delle attività. |

| | | |
|---|--|-----------------|
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p>Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria</p> | Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro | Rev. 2 |
| | ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_ | Data 14/04/2020 |
| | | Pagina 6 di 9 |

| ASSISTENZA DOMICILIARE | |
|--|--|
| <p>ASSISTENZA DI PAZIENTI SOSPETTI O ACCERTATI DI COVID-19</p> <p><i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata) - Copricapo monouso - Mascherina chirurgica o facciale filtrante almeno FFP2 - Sovracamice idrorepellente TNT a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile - Sovrascarpe¹ - Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera - Doppi guanti in nitrile non sterili monouso <p><i>Il facciale filtrante FFP2 / FFP3 si utilizza in luogo della mascherina chirurgica se si effettuano procedure che generano aerosol.</i></p> |
| <p>ASSISTENZA DI PAZIENTI PSICHIATRICI NON SOSPETTI O ACCERTATI DI COVID-19</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata) - Mascherina chirurgica per l'operatore sanitario - Sovracamice TNT - Schermo facciale - Guanti in nitrile monouso <p>in aggiunta agli altri dispositivi previsti per l'ordinario svolgimento dell'attività (inclusa la divisa da lavoro).</p> <p><i>Per l'assistenza a pazienti psichiatrici che convivono con casi sospetti o accertati di COVID-19 utilizzare i dispositivi di protezione individuale identificati per l'assistenza ai pazienti psichiatrici accertati COVID-19.</i></p> |
| <p>ASSISTENZA DI TUTTI GLI ALTRI PAZIENTI</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata) - Mascherina chirurgica per l'operatore sanitario - Sovracamice TNT - Guanti in nitrile monouso <p>in aggiunta agli altri dispositivi previsti per l'ordinario svolgimento dell'attività.</p> <p><i>Il facciale filtrante FFP2 / FFP3 si utilizza in luogo della mascherina chirurgica solo se si effettuano procedure che generano aerosol.</i></p> |

| | | |
|---|--|-----------------|
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p>Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria</p> | Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro | Rev. 2 |
| | ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_ | Data 14/04/2020 |
| | | Pagina 7 di 9 |

| PERSONALE TECNICO (SUAT, SUIC, SPPA, DSP⁵, EQ, ICT,...) | |
|---|--|
| <p>1- Accesso nelle aree contaminate (in cui si effettua assistenza di casi sospetti o accertati di infezione SARS-CoV-2)</p> <p><i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.</i></p> <p><i>I dispositivi vengono forniti dal personale del reparto.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Copricapo monouso - Mascherina chirurgica o facciale filtrante FFP2*** - Sovracamicie TNT - Sovrascarpe¹ - Occhiali protettivi a visiera - Guanti in nitrile non sterili monouso <p><i>***Utilizzare il facciale filtrante FFP2 solo se si accede in una stanza dove siano in corso procedure che generano aerosol.</i></p> |
| <p>2- Accesso a tutti i locali ove vi sia presenza di pazienti/utenti e/o altro personale</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica |
| PERSONALE CHE EFFETTUA LA PULIZI E L'IGIENIZZAZIONE (AMBULANZE O LOCALI CONTAMINATI) | |
| <p>1- Attività in presenza di paziente sospetto o accertato COVID-19</p> <p><i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Copricapo monouso - Mascherina chirurgica o facciale filtrante FFP2** - Sovracamicie TNT - Sovrascarpe¹ - Occhiali protettivi a visiera - Guanti in nitrile non sterili monouso <p><i>**Utilizzare il facciale filtrante FFP2 in luogo della mascherina chirurgica solo se la pulizia ed igienizzazione del locale viene effettuata in presenza di paziente sottoposto a procedure che generano aerosol.</i></p> |
| <p>2- Attività in assenza di paziente</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per l'operatore sanitario - Sovracamicie TNT - Sovrascarpe¹ - Guanti in nitrile non sterili monouso |

| | | |
|---|--|-----------------|
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p>Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria</p> | Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro | Rev. 2 |
| | ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_ | Data 14/04/2020 |
| | | Pagina 8 di 9 |

Note:

1. Il sovrascarpe non è da considerarsi un dispositivo di protezione individuale pertanto non è strettamente indispensabile nell'assistenza.
2. Utilizzare la mascherina chirurgica per l'assistenza al paziente COVID-19 laddove non vengono eseguite procedure che generano aerosol sul paziente assistito o su altri pazienti presenti nella stessa area o reparto e in generale dove non vi sia un'elevata attività assistenziale su pazienti COVID-19.
3. Nei reparti COVID-19 ove si presume vi sia una elevata attività assistenziale ed una prolungata esposizione al rischio, anche al fine di razionalizzare l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è opportuno utilizzare il facciale filtrante FFP2 o FFP3 per tutta la durata dell'attività assistenziale, su tutti i pazienti.
4. Per gli operatori non impegnati nell'assistenza e che operano nei locali non contaminati ad uso esclusivo del personale è indicato l'utilizzo della mascherina chirurgica. Anche in questi contesti la mascherina chirurgica deve essere indossata correttamente e non manipolata. Laddove necessaria la presenza in uno stesso locale di più di un operatore, mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Il facciale filtrante almeno FFP2 è indicato anche al di fuori dell'assistenza, nei contesti ove vi sia una possibile esposizione ad aerosolizzazione ed in generale, per un razionale utilizzo dei dispositivi di protezione, ove lo stesso personale operi prima in aree non contaminate e poi in aree contaminate durante lo stesso turno lavorativo, fatto salvo che al termine dell'attività assistenziale e passando dalle aree contaminate a quelle non contaminate il facciale filtrante deve essere sostituito.
5. Il personale che svolge attività ispettiva di vigilanza sul territorio per le attività non differibili deve utilizzare la mascherina chirurgica qualora non sia possibile mantenere una distanza interpersonale di almeno 1mt. Le attività di vigilanza effettuate all'interno delle strutture sanitarie devono essere effettuate sempre indossando la mascherina chirurgica.
6. Procedure che generano aerosol a rischio elevato: intubazione ed estubazione endotracheali, ventilazione oscillatoria ad alta frequenza, ventilazione con pallone ambu, broncoscopia e lavaggio broncoalveolare, laringoscopia, ventilazione a pressione positiva (BiPAP e CPAP), autopsia del tessuto polmonare, lavaggio nasofaringeo, aspirazione e scopia, induzione dell'espettorato, tampone nasofaringeo.

Altre procedure a rischio che generano aerosol: aspirazione delle vie aeree, ossigeno ad alto flusso (inclusi allestimenti O2 singoli e doppi, Optiflow e Airvo), interruzione del sistema di ventilazione chiuso intenzionalmente (ad esempio aspirazione aperta) o involontariamente (ad esempio movimento del paziente), rianimazione cardiopolmonare (CPR), tracheostomia, fisioterapia toracica (dispositivo per la tosse manuale e meccanico – MI-E), somministrazione di farmaci in aerosol o nebulizzanti, irrigazione di ascessi / ferite (esclusi pazienti con tubercolosi polmonare).

| | | |
|---|--|-----------------|
|  <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p>Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria</p> | Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro | Rev. 2 |
| | ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_ | Data 14/04/2020 |
| | | Pagina 9 di 9 |

Indicazioni generali:

- I dispositivi di protezione oculare pluriuso (schermo facciale e occhiali protettivi) devono essere ricondizionati dopo ogni utilizzo, decontaminandoli con salviette GIOCLOR WIPES o con pannetti monouso e soluzione di GIOCLOR al 10% (100 ml di prodotto + 900 ml di acqua per 5 min di contatto) prima di collocarli in un sacchetto/contenitore pulito.
- L'utilizzo del facciale filtrante FFP2 o FFP3 con valvola da parte dell'operatore sanitario è consentito solo nell'assistenza dei pazienti COVID-19+ e non dei pazienti sospetti. Il facciale filtrante FFP2 o FFP3 con valvola o senza non deve essere fatto utilizzare al paziente.
- I Dispositivi di Protezione devono essere indossati in un locale "pulito" e rimossi o all'interno della stanza del paziente COVID-19 o all'interno di un locale appositamente identificato a tale scopo, a seconda dell'organizzazione che è stata definita all'interno del reparto, anche in relazione alle caratteristiche strutturali dello stesso. È fatto divieto di uscire dai reparti/aree ove vi sono pazienti COVID-19 sospetti o accertati con i Dispositivi di Protezione utilizzati all'interno del reparto/area. È fatto divieto di recarsi negli spogliatoi con i Dispositivi di Protezione utilizzati nei reparti/aree COVID-19. L'accesso agli spogliatoi deve avvenire in modo regolamentato al fine di evitare assembramenti e di garantire sempre la possibilità di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
- La mascherina chirurgica ed i facciali filtranti FFP2/FFP3, ad uso personale, possono essere utilizzati al massimo per la durata di un turno di lavoro e comunque dovranno essere sostituiti quando contaminati da liquidi biologici e/o se manipolati in modo improprio. Prima di indossare e rimuovere i dispositivi di protezione delle vie respiratoria eseguire l'igiene delle mani con gel alcolico o lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.
- Nel caso si debba prestare assistenza a più pazienti con diagnosi accertata di COVID-19, tra un paziente e l'altro sostituire sempre i guanti ed effettuare l'igiene delle mani. Sostituire il sovracamice idrorepellente e/o la mascherina chirurgica/facciale filtrante se bagnati o visibilmente contaminati da materiale biologico.
- Nel caso si debba prestare assistenza a pazienti con sospetta diagnosi di COVID-19, tra un paziente e l'altro sostituire sempre i guanti ed effettuare l'igiene delle mani. Sostituire il sovracamice idrorepellente e/o la mascherina chirurgica/facciale filtrante se bagnati o visibilmente contaminati da materiale biologico e comunque sostituire sempre il sovracamice in caso di contatto diretto con il paziente.
- Nel caso si debba prestare assistenza ad un paziente con sospetta diagnosi di COVID-19 e ad un paziente con accertata diagnosi di COVID-19, cominciare l'assistenza dal caso sospetto e tra un paziente e l'altro sostituire sempre i guanti ed effettuare l'igiene delle mani. Sostituire il sovracamice e la mascherina chirurgica/facciale filtrante se bagnati o visibilmente contaminati da materiale biologico.
- Laddove si verificasse una carenza temporanea di dispositivi di protezione individuale utilizzare i dispositivi disponibili di livello superiore (ad esempio facciale filtrante in luogo della mascherina chirurgica, tuta in luogo del sovracamice idrorepellente TNT).