	DPI-DM	SPPA_ADDESTRAMENTO_DPI.013	Ed.1	Rev.1
	INDOSSARE E RIMUOVERE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI MEDICI E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE RISCHIO CORONAVIRUS		24/02/2020	
			Pag. 1 di 2	

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI DI MALATTIA DA CORONAVIRUS PER L'ASSISTENZA DEI PAZIENTI PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE (PRONTO SOCCORSO, UNITA' OPERATIVE)

SEQUENZA PER RIMUOVERE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI MEDICI (DM) E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) indicati nella presente istruzione sono allineati alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

N.B. Eseguire la vestizione nell'area identificata a tale scopo.

Rimuovere anelli, bracciali, orologio, etc...

Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare il COPRICAPO

- Il copricapo deve contenere tutti i capelli e coprire bene le orecchie.

Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare il PRIMO PAIO DI GUANTI (in nitrile)

- Prima di indossare i guanti assicurarsi che le mani siano perfettamente asciutte.
- Scegliere i guanti della taglia giusta e controllarne l'integrità.
- Distendere i guanti sino a coprire completamente i polsi.

Indossare il SOVRACAMICE impermeabile

- Prelevare il sovracamice dalla confezione, dispiegarlo tenendolo per il girocollo.
- Indossare il sovracamice avendo cura di posizionare i polsini in modo che la parte dei guanti ai polsi sia completamente coperta.
- Chiudere il sovracamice all'altezza della nuca e sul retro, sovrapponendo i due lembi dell'apertura. Questo garantisce una protezione completa del corpo e degli indumenti indossati.
- Allacciare il sovracamice sul fianco.

Indossare il FACCIALE FILTRANTE FFP2 a protezione delle vie respiratorie

- Indossare il facciale filtrante FFP2 avendo cura di assicurare gli elastici sul capo e intorno al collo sotto le orecchie.
- Adattare al viso modellando il DPI con una leggera compressione delle dita sul naso e sotto al mento. Modellare lo stringinaso.
- Eseguire la prova di tenuta appoggiare le mani sul facciale filtrante ed inspirare rapidamente: il facciale filtrante si deve ritrarre leggermente. Se non si avvertono perdite d'aria tra il viso ed il bordo di tenuta, significa che il respiratore è stato indossato correttamente. Se viene avvertita una perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o degli elastici e rifare la prova di tenuta.


ATTENZIONE: il dispositivo non è certificato per garantire una protezione efficace per gli operatori con la barba non rasata.

Indossare la VISIERA di protezione

- Indossare la visiera avendo cura di non lasciare spazio tra il dispositivo e le sopracciglia.
- Dopo aver posizionato la visiera, assicurarsi che il copricapo copra ancora bene le orecchie.

Indossare il SECONDO PAIO DI GUANTI (in nitrile)

- Scegliere i guanti della taglia giusta e controllarne l'integrità.
- Distendere i guanti sino a coprire completamente i polsi.

	DPI-DM	SPPA_ADDESTRAMENTO_DPI.013	Ed.1	Rev.1
	INDOSSARE E RIMUOVERE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI MEDICI E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE RISCHIO CORONAVIRUS		24/02/2020	
			Pag. 2 di 2	

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI DI MALATTIA DA CORONAVIRUS PER L'ASSISTENZA DEI PAZIENTI PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE (PRONTO SOCCORSO, UNITA' OPERATIVE)

SEQUENZA PER RIMUOVERE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI MEDICI (DM) E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

N.B. Eseguire la rimozione dei DPI nell'area identificata a tale scopo.
I DPI/DM rimossi devono essere collocati nel contenitore rigido per rifiuti sanitari a rischio infettivo.

Rimuovere il PRIMO PAIO DI GUANTI

ATTENZIONE: La parte esterna dei guanti potrebbe essere contaminata.

- Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l'altra mano guantata in modo tale da evitare di strapparli o di togliere contemporaneamente anche l'altro guanto sottostante.
- Trattenere il guanto tolto nel palmo della mano che indossa ancora i guanti.
- Rimuovere l'altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

Rimuovere il SOVRACAMICE

ATTENZIONE: La parte esterna anteriore potrebbe essere contaminata.

- Slacciare i cordoni ed afferrare il sovracamice di protezione da dietro la schiena.
- Rovesciare l'indumento avendo cura di arrotolarlo dall'interno all'esterno.

Rimuovere il SECONDO PAIO DI GUANTI

- Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l'altra mano in modo tale da evitare di strapparli. Non toccare le parti scoperte (polso, braccio)
- Trattenere il guanto tolto nel palmo della mano.
- Rimuovere l'altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare un paio di guanti puliti

Rimuovere la VISIERA di protezione

ATTENZIONE: La parte anteriore potrebbe essere contaminata.

- Rimuovere il dispositivo afferrandolo da dietro la testa ove è improbabile la contaminazione.
- Se il dispositivo è pluriuso, questo andrà ricondizionato decontaminandolo con l'uso di salviette GIOCLOR WIPES e collocandolo in un sacchetto/contenitore per poi sottoporlo a trattamento di detersione e disinfezione (GIOCLOR WIPES).

Rimuovere il FACCIALE FILTRANTE

ATTENZIONE: La parte anteriore potrebbe essere contaminata.

- Rimuovere il dispositivo afferrandolo da dietro la nuca ove è improbabile la contaminazione.

Rimuovere il COPRICAPO

ATTENZIONE: La parte anteriore potrebbe essere contaminata.

- Afferrare il copricapo dalla parte posteriore del capo

Rimuovere il SECONDO PAIO DI GUANTI


- Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l'altra mano in modo tale da evitare di strapparli. Non toccare le parti scoperte (polso, braccio)
- Trattenere il guanto tolto nel palmo della mano.
- Rimuovere l'altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

Eseguire l'igiene delle mani con il GEL ALCOLICO

GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO

Per chiudere il contenitore l'operatore deve:

- Eseguire l'igiene delle mani con GEL ALCOLICO.
- Indossare un paio di guanti (in nitrile).
- Chiudere il sacco interno avendo cura di non toccare la parte che contiene il rifiuto.
- Chiudere il sacco con l'apposita fascetta senza comprimere il contenuto.
- Chiudere il contenitore con il coperchio.

	DPI-DM	SPPA_ADDESTRAMENTO_DPI.013	Ed.1	Rev.1
	INDOSSARE E RIMUOVERE CORRETTAMENTE I DISPOSITIVI MEDICI E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE RISCHIO CORONAVIRUS		24/02/2020	
			Pag. 3 di 2	

N.B. Il rifiuto dovrà essere inviato allo smaltimento assicurandosi che anche il contenitore venga termodistrutto. In caso di contenitore riutilizzabile apporre sullo stesso una etichetta con l'indicazione *“Attenzione contenitore da sottoporre a termodistruzione”*.