

ਐਟੀਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ:-

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨੋਟ:-

COMIRNATY ਕੋਮੀਰਨਟੀ (ਬਾਇਓਟੈਕ/ਫਾਈਜਰ)

COMIRNATY (ਕੋਮੀਰਨਟੀ) ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ

COMIRNATY (ਕੋਮੀਰਨਟੀ) ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ SARS-CoV-2 ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ

COMIRNATY (ਕੋਮੀਰਨਟੀ) ਬਾਲਗ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਇਮੂਨੀਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਇਹ ਐਟੀਬਾਡੀਸ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ COMIRNATY (ਕੋਮੀਰਨਟੀ) ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ.

COMIRNATY (ਕੋਮੀਰਨਟੀ) ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:-

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ).

ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ) ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ :

- ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਾਂ COMIRNATY (ਕੋਮੀਰਨਟੀ) ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ.
- ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ
- ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, (ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜੁਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ)
- ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ(ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰੋਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜਖਮ ਹੋ ਜਾਣਾ) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ(ਗਟਲੀਆ) ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ.
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੂਨੀਸਿਸਟਮ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ (HIV) ਲਾਗ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਇਮੂਨੀਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡਸ

COMIRNATY (ਕੋਮੀਰਨਟੀ) ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੀਕਰੋਬੀਓਲੋਜੀ (ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਜ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰੀਕਾਰੀਟੇ (ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਦੀ ਸੋਜ) ਇਹ ਨੌਰਮਲੀ ਵੈਕਸੀਨ (ਟੀਕਾ) ਲੈਣ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਦ ਇਹ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਵੈਕਸੀਨ (ਡੋਜ) ਤੋਂ ਬਾਦ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿਚ. ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੀਕਰੋਬੀਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੈਰੀਕਾਰੀਟੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਧੜਕਨ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ , ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ.

ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ COMIRNATY (ਕੋਮੀਰਨਟੀ) :-

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ) ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਕਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਰਿਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ

ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ **COMIRNATY** (ਕੋਮੀਰਨਟੀ) ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ. ਜਾਨਵਰਾ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸਿਧੇ ਜਾ ਅਸਿਧੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀ ਮਿਲੇ (ਭਰੂਣ ਅਵਸਥਾ, ਸ਼ੀਸੂ ਜਣੇਪੇ ਜਾ ਜਨਮ ਤੋ ਬਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ) ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ **COMIRNATY** (ਕੋਮੀਰਨਟੀ) ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀ ਉਦੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਜਦੋ ਮਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲਾਭ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਵੱਧ ਹੋਣ.

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆ ਸੀਮਾਵਾ:-

ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਸਟਡੀ (study) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਿਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆ ਟੀਕਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ **COMIRNATY** (ਕੋਮੀਰਨਟੀ) ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ. ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨਾ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ. ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਅਜੇ ਤੱਕ (ਮਾਸਕ, ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ) ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

COMIRNATY (ਕੋਮੀਰਨਟੀ) ਕਿਵੇ ਦਿਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ:-

COMIRNATY (ਕੋਮੀਰਨਟੀ) ਬਾਹ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਭਾਗ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ. ਟੀਕੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋ ਬਾਦ ਉਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ 3 ਹਫਤਿਆ ਵਿਚ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 42 ਦਿਨਾ ਤੋ ਪਹਿਲਾ) ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾ ਜੋ ਇਮੂਨੀਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰਿਜਲਟ ਬਹਿਤਰ ਆਵੇ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਦੇ ਹੋ ਤਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਜਿਹਨਾ ਬੰਦਿਆ ਦੀ ਇਮੂਨੋਸੋਪਰੇਸਿਉਨੇ (immunosoppressione) ਦੇ ਹਲਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜਲਟ ਆਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ 28 ਦਿਨਾ ਬਾਦ ਇਕ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਨਿਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ EMA (ਏਜੰਸੀ ਈਰੋਪਾ ਚੈਲ ਫਾਰਮਕੋ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀ **COMIRNATY** (ਕੋਮੀਰਨਟੀ) (AIFA) ਨੇ ≥ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 648/961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ.

COMIRNATY (ਕੋਮੀਰਨਟੀ) ਦੀ ਵਰਤੋ ਮਿਸ਼ਰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋ ਘੱਟ ਤੱਕ ਦਿਆ ਨੂੰ ਜਿਨਾ ਨੇ ਵੈਕਸਜੇਵਰੀਆ (**Vaxzevria**) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ 8 ਤੋ 12 ਹਫਤਿਆ ਪਹਿਲਾ ਲਈ ਸੀ. ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਹਨ. ਪਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀ (**AIFA**) ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਨੰਬਰ **0026246- 11/06/2021- DGP** ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 648/961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਵੈਕਸਜੇਵਰੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੈ. ਇਸਨੂੰ ਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦਾ ਕਲੀਨੀਕਲ ਡਾਟਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਡ-ਅਫੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀ ਅਲਗ (ਡਿਫਰੈਂਟ) ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾ ਲਈ ਹੈ.

ਸਾਈਡ-ਅਫੈਕਟ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ :-

ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ **COMIRNATY** (ਕੋਮੀਰਨਟੀ) ਸਾਈਡ-ਅਫੈਕਟ (ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ.

ਆਮ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ (10 ਵਿਚੋ 1 ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)

- ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ

- ਥਕਾਵਟ
- ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ
- ਠੰਡ ਨਾਲ ਕੰਬਣਾ
- ਜੋੜਾ ਦਾ ਦਰਦ
- ਦਸਤ
- ਬੁਖਾਰ

ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਆਦਾ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ

ਆਮ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ (10 ਵਿਚੋਂ 1 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)

- ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਲੀ
- ਮਨ ਮਚਲਾਉਣਾ (ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰਨਾ)
- ਉਲਟੀ

¹ La Legge n. 648/96 consente ai medici l'utilizzo a carico del SSN di farmaci che si sono dimostrati efficaci e sicuri nel trattamento di una determinata patologia, ma che non sono autorizzati per quella specifica indicazione terapeutica.

ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 648/96 ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਸ਼ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕੇਤ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਅਸਧਾਰਨ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ (100 ਵਿਚੋਂ 1 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)

- ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਿੰਫੋਨੋਦੀ (linfonodi)
- ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ
- ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ
- ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ
- ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਜਲੀ
- ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ

ਦੁਰਲੱਭ (rare) ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ (1000 ਵਿਚੋਂ 1 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ):

- ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਅੰਧਰਗ
- ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਪਾਕੀ (orticaia) ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੋਜ

ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ (ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

- ਗੰਭੀਰ ਅਲੈਰਜੀ
- ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਜਸ (ਮੀਉਕਰਦੀਤੇ) ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਦੀ ਸੋਜਸ (ਪੇਰੀਕਾਰਦੀਤੇ) ਜੋ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਧੜਕਨ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ (<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>).

COMIRNATY (ਕੋਮੀਰਨਟੀ) ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ

ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਇਕ ਐਂਟੀ-ਕੋਵਿਡ-19 mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ

ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ:

((4-ਈਦਰੋਸੀਬੂਟਿਲ)ਆਜਾਨੋਦੀਲ)ਬਿਸ(ਏਜਾਨੋ-6,1ਦੀਲ)ਬਿਸ(2-ਏਸੀਲਦੇਕਾਨੋਆਤੋ)(ALC-0315); 2-[(ਪੋਲੀਏਤਿਲੇਨਗਲੀਕੋਲੇ)-2000]N,N-ਦੀਤੇਤਰਾਦੇਸ਼ੀਲਾਸ਼ੇਤਾਮੀਦੋ(ALC-0159); 1,2-ਦਿਸਤੇਅਰੋਇਲ-sn-ਗਲੀਸੇਰੋ-3-ਫੋਸਫੋਕੋਲੀਨਾ(DSPC); ਕੋਲੇਸਤੇਰੋਲੋ; ਪੋਤਾਸੀਓ ਕਲੋਰੂਰੋ; ਪੋਤਾਸੀਓ ਦੀਦਰੋਜੇਨੋ ਫੋਸਫਾਤੋ; ਸੋਦੀਓ ਕਲੋਰੂਰੋ; ਫੋਸਫਾਤੋ ਦੀਸੋਦੀਕੋ ਦੀਦਰਾਤੋ; ਸਾਕਾਰੋਜੀਓ; ,ਟੀਕੋ ਲਈ ਪਾਣੀ

Cosa contiene Comirnaty

Il principio attivo è un vaccino a mRNA anti-COVID-19.

Gli altri componenti sono: ((4-idrossibutil)azanediil)bis(esano-6,1-diil)bis(2-esildecanoato) (ALC-0315); 2-[[polietilenglicole)-2000]-N,N-ditetradecilacetammide (ALC-0159); 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC); colesterolo; potassio cloruro; potassio diidrogeno fosfato; sodio cloruro; fosfato disodico diidrato; saccarosio; acqua per preparazioni iniettabili.