

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria	Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro	Rev. 3
	ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_	Data 01/06/2020
		Pagina 1 di 12

REVISIONI

Rev.	Data	Pagine Modificate	Tipo – natura della modifica
0	27/02/2020		Prot. AUSL n. 16043/20 del 27/02/2020 (lettera DS)
1	09/03/2020	tutte	Prot. AUSL n. 18855/20 del 09/03/2020 (lettera DS)
2	14/04/2020	tutte	Aggiornamento assegnazione dei DPI/DM
3	Data riportata in intestazione	tutte	Aggiornamento assegnazione dei DPI/DM

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p>Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria</p>	Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro	Rev. 3
	ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA	Data 01/06/2020
	RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_	Pagina 2 di 12

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE e DISPOSITIVI BARRIERA	
Descrizione attività	Identificazione DPI/DM
<p>ACCOGLIENZA AI VARCHI DI ACCESSO ALLE STRUTTURE attività di controllo a tutti coloro che accedono alla struttura (utenti/pazienti/visitatori/operatori ditte esterne/fornitori,...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per l'operatore sanitario - Sovracamicie - Occhiali protettivi a visiera - Copricapo <p><i>Mascherina chirurgica a tutte le persone che accedono alle strutture aziendali (pazienti, visitatori e caregiver, fornitori, operatori di ditte esterne,...) ed igiene delle mani.</i></p> <p><i>La mascherina chirurgica viene controllata a tutti coloro che accedono alla struttura (utenti/pazienti/visitatori/operatori ditte esterne/fornitori,...) e consegnata a chi ne sia sprovvisto.</i></p>
<p>IN TUTTI I CONTESTI LAVORATIVI NON ASSISTENZIALI (SANITARI E NON) Es. Aree amministrative, uffici, studi medici, call centre, front office,...</p>	<p>Mascherina chirurgica e frequente igiene delle mani durante l'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa. Arieggiare frequentemente i locali.</p> <p><i>Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt. Qualora questa distanza non possa essere garantita allestire, nelle postazioni di front office, uno schermo in plexiglass di separazione dall'utente.</i></p>
<p>ASSISTENZA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AL PAZIENTE ASINTOMATICO PER COVID-19 IN ASSENZA DI CONTATTO DIRETTO (ad esempio durante l'anamnesi, indagine epidemiologica, colloquio psicologico, consulenza-ascolto,...) mantenendo una distanza col paziente di almeno un metro.</p>	<p>Mascherina chirurgica a tutto il personale (sanitario e amministrativo), durante tutto il turno lavorativo, in aggiunta agli altri dispositivi previsti per l'ordinario svolgimento dell'attività e fatto salvo le indicazioni sotto riportate.</p> <p><i>Qualora il paziente non possa indossare la mascherina chirurgica il personale sanitario deve utilizzare anche gli occhiali protettivi o lo schermo facciale e mantenere una distanza di almeno 1 metro.</i></p>
<p>ASSISTENZA AL PAZIENTE ASINTOMATICO PER COVID-19 E CON TAMPONE NEGATIVO (REGIME DI RICOVERO) IN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata) - Mascherina chirurgica per l'operatore sanitario

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p>Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria</p>	Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro	Rev. 3
	ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_	Data 01/06/2020
		Pagina 3 di 12

CASO DI CONTATTO DIRETTO	<i>Qualora il paziente non possa indossare la mascherina chirurgica il personale sanitario deve indossare anche gli occhiali protettivi o lo schermo facciale.</i>
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LIVELLO BASE	
ASSISTENZA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AL PAZIENTE CON FEBBRE E/O ALTRI SINTOMI COMPATIBILI CON COVID-19 IN ASSENZA DI CONTATTO DIRETTO (ad esempio durante l'anamnesi, indagine epidemiologica, colloquio psicologico, filtri triage,...) mantenendo una distanza col paziente di almeno un metro. <i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata) - Mascherina chirurgica per l'operatore sanitario - Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera - Sovracamice - Copricapo <i>Il personale sanitario deve indossare i dispositivi di protezione individuale di LIVELLO 1 qualora il paziente non possa indossare la mascherina chirurgica.</i>
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LIVELLO 1	
ASSISTENZA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE NON DIFFERIBILI AI CASI SOSPETTI / ACCERTATI DI COVID-19 IN CASO DI CONTATTO DIRETTO (ad esempio visita, contatto con il paziente per l'esecuzione di esami diagnostici, fisioterapia,...) Contesti organizzativi ove non vi sia una elevata concentrazione di pazienti COVID-19 e non si eseguono procedure che generano aerosol. CHIRURGICA AMBULATORIALE MINORE A TUTTI I PAZIENTI (dove non si generano aerosol) ASSISTENZA AL PAZIENTE IN ATTESA DEL TAMPONE	<ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata) - Copricapo monouso - Mascherina chirurgica per operatore sanitario² - Sovracamice idrorepellente a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile - Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera - Sovrascarpe¹ - Doppi guanti in nitrile non sterili monouso

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p>Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria</p>	Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro	Rev. 3
	ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_	Data 01/06/2020
		Pagina 4 di 12

PRE-RICOVERO	
ASSISTENZA AI CONTATTI DI CASO ACCERTATI	
<i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.</i>	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LIVELLO AVANZATO	
ASSISTENZA DI CASI SOSPETTI/ACCERTATI DI COVID-19 Contesti ove vi sia una elevata concentrazione di pazienti COVID-19 e/o quando si eseguono procedure che generano aerosol (REPARTI E AREE COVID-19, PMA, Ambulatori). <i>Tra le misure organizzative prevedere l'identificazione e la separazione, anche tramite segnaletica a terra, tra aree contaminate ed aree non contaminate, atte ad evitare l'utilizzo promiscuo delle aree stesse.</i> <i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.</i>	PERSONALE CHE SVOLGE L'ASSISTENZA <ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata) - Copricapo monouso - Facciale filtrante FFP2 / FFP3³ - Sovracamice idrorepellente a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile - Sovrascarpe¹ - Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera - Doppi guanti in nitrile non sterili monouso PERSONALE CHE SUPPORTA L'ASSISTENZA E/O CHE OPERA NELLE AREE NON CONTAMINATE <ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica o facciale filtrante FFP2⁴ - Sovracamice
ESECUZIONE DEL TAMPONE OROFARINGEO E RINOFARINGEO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE, A DOMICILIO O IN ALTRO LUOGO PROCEDURE CHE GENERANO AEROSOL: <ul style="list-style-type: none"> - Vedi Elenco in NOTA 6: su tutti i pazienti. - PROCEDURE ODONTOIATRICHE, PROCEDURE ENDOSCOPICHE CHE INTERESSANO LE VIE DIGESTIVE, 	<ul style="list-style-type: none"> - Copricapo monouso - Facciale filtrante FFP2 / FFP3 - Sovracamice idrorepellente a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile - Sovrascarpe o calzari a gambale - Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera - Doppi guanti in nitrile non sterili monouso

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p>Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria</p>	Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro	Rev. 3
	ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_	Data 01/06/2020
		Pagina 5 di 12

<p>PROCEDURE ORL CHE INTERESSANO LE VIE AEREE, ENDOCRINOLOGIA CON AGO ASPIRATO, PNEUMOLOGIA: su tutti i pazienti.</p> <p><i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.</i></p>	<p><i>*Il facciale filtrante FFP3 è indicato prioritariamente nelle attività a rischio elevato (vedi NOTA6). Per le procedure che generano aerosol, nelle attività ambulatoriali, fare indossare all'utente i calzari (da indossare e togliere all'interno dell'ambulatorio)</i></p>
<p>118 PER TRASPORTO DI TUTTI I PAZIENTI</p> <p><i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata) - Copricapo monouso (in associazione al sovracamice) - Facciale filtrante FFP2 / FFP3 - Sovracamice idrorepellente a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile/Tuta integrale protettiva idrorepellente solo per il 118 - Calzari a gambale (in associazione al sovracamice o alla tuta se priva di calzari incorporati) - Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera - Doppi guanti in nitrile non sterili monouso <p><i>Si raccomanda l'utilizzo della tuta integrale protettiva da parte di personale adeguatamente formato ed addestrato.</i></p>

INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE e DISPOSITIVI BARRIERA IN CONTESTI SPECIFICI E PARTICOLARI

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p>Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria</p>	Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro	Rev. 3
	ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA	Data 01/06/2020
	RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_	Pagina 6 di 12

Descrizione	Identificazione DPI/DM
ATTIVITA' AMBULATORIALE	
<p>ASSISTENZA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN CASO DI CONTATTO DIRETTO MA NON RAVVICINATO VISO A VISO (fisioterapia, attività ambulatoriali, centro prelievi, pediatria di comunità, screening mammografico, pap test,...)</p> <p><i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata) - Mascherina chirurgica per l'operatore sanitario - Sovracamice - Schermo facciale o occhiali di protezione a visiera - Guanti in nitrile non sterili monouso per l'operatore <p><i>Qualora il paziente non possa indossare la mascherina chirurgica il personale sanitario deve utilizzare anche il copricapo in aggiunta a quanto sopra.</i></p>
<p>ASSISTENZA E PRESTAZIONI IN CASO DI CONTATTO DIRETTO E RAVVICINATO VISO A VISO (ambulatorio oculistico, neuropsichiatria infantile, specialistiche nelle quali sono previste procedure invasive a distanza ravvicinata al viso)</p> <p><i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata) - Mascherina chirurgica per l'operatore sanitario* - Sovracamice - Schermo facciale - Copricapo - Guanti in nitrile non sterili monouso per l'operatore <p><i>*Nel caso in cui il paziente/utente sia impossibilitato ad indossare la mascherina chirurgica, e l'operatore sanitario deve utilizzare il facciale filtrante FFP2.</i></p>
<p>ASSISTENZA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN CASO DI CONTATTO DIRETTO E RAVVICINATO VISO A VISO E IMPOSSIBILITA' ALL'USO DELLA MASCHERINA DA PARTE DELL'OPERATORE SANITARIO (logopedista, assistenza a pazienti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Copricapo - Sovracamice - Schermo facciale speciale (coprente fino allo sterno)* o in alternativa mascherina "trasparente" associata a schermo facciale - Guanti in nitrile non sterili monouso per l'operatore

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p>Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria</p>	Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro	Rev. 3
	ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_	Data 01/06/2020
		Pagina 7 di 12

<p>sordomuti,...)</p> <p><i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.</i></p>	<p><i>*Lo schermo facciale speciale protegge completamente le mucose di occhi, naso e bocca dal droplet. Adozione di schermi in plexiglass tra operatore e paziente e mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.</i></p>
ATTIVITA' CHIRURGICA E OSTETRICIA (TRAVAGLIO)	
<p>INTERVENTI CHIRURGICI A TUTTI I PAZIENTI</p> <p><i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Copricapo monouso - Facciale filtrante FFP2 / FFP3 - Sovracamice idrorepellente a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile - Sovrascarpe¹ - Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera - Doppi guanti in nitrile non sterili monouso
CSM – SPDC	
<p>ASSISTENZA A PAZIENTI PSICHIATRICI ASINTOMATICI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata) - Mascherina chirurgica per l'operatore sanitario - Sovracamice - Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera - Guanti in nitrile non sterili monouso
LABORATORI (Microbiologia e Tossicologia)	
<p>Le attività presso il laboratorio di microbiologia devono essere condotte sotto cappa a flusso laminare di classe 2 con vetro abbassato.</p>	<p>Mascherina chirurgica o facciale filtrante FFP2 in aggiunta agli altri dispositivi di protezione previsti dall'ordinario svolgimento delle attività.</p>
<p>Attività presso il laboratorio di tossicologia</p>	<p>Facciale filtrante FFP2 in aggiunta agli altri dispositivi di protezione previsti dall'ordinario svolgimento delle attività.</p>

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p>Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria</p>	Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro	Rev. 3
	ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_	Data 01/06/2020
		Pagina 8 di 12

per la determinazione di anticorpi CoV2 IgG e IgM.	
ASSISTENZA DOMICILIARE	
<p>ASSISTENZA DI PAZIENTI SOSPETTI O ACCERTATI DI COVID-19</p> <p><i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata) - Copricapo monouso - Mascherina chirurgica o facciale filtrante almeno FFP2 - Sovracamice idrorepellente a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile - Sovrascarpe¹ - Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera - Doppi guanti in nitrile non sterili monouso <p><i>Il facciale filtrante FFP2 / FFP3 si utilizza in luogo della mascherina chirurgica se si effettuano procedure che generano aerosol.</i></p>
<p>ASSISTENZA DI PAZIENTI PSICHIATRICI ASINTOMATICI PER COVID-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata) - Mascherina chirurgica per l'operatore sanitario - Sovracamice - Schermo facciale - Guanti in nitrile monouso <p>in aggiunta agli altri dispositivi previsti per l'ordinario svolgimento dell'attività (inclusa la divisa da lavoro).</p> <p><i>Per l'assistenza a pazienti psichiatrici che convivono con casi sospetti o accertati di COVID-19 utilizzare i dispositivi di protezione individuale identificati per l'assistenza ai pazienti psichiatrici accertati COVID-19.</i></p>
<p>ASSISTENZA DI TUTTI GLI ALTRI PAZIENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata) - Mascherina chirurgica per l'operatore sanitario - Sovracamice - Guanti in nitrile monouso <p>in aggiunta agli altri dispositivi previsti per l'ordinario svolgimento dell'attività.</p>

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p>Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria</p>	Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro	Rev. 3
	ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_	Data 01/06/2020
		Pagina 9 di 12

	<i>Il facciale filtrante FFP2 / FFP3 si utilizza in luogo della mascherina chirurgica solo se si effettuano procedure che generano aerosol.</i>
PERSONALE TECNICO (SUAT, SUIC, SPPA, DSP⁵, EQ, ICT,...)	
<p>1- Accesso nelle aree contaminate (in cui si effettua assistenza di casi sospetti o accertati di infezione SARS-CoV-2)</p> <p><i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.</i></p> <p><i>I dispositivi vengono forniti dal personale del reparto.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Copricapo monouso - Mascherina chirurgica o facciale filtrante FFP2* - Sovracamice - Sovrascarpe¹ - Occhiali protettivi a visiera - Guanti in nitrile non sterili monouso <p><i>*Utilizzare il facciale filtrante FFP2 se si effettua un intervento in ambito sanitario in reparti con pazienti COVID-19 e dove siano in corso procedure che generano aerosol.</i></p>
2- Accesso a tutti i locali ove vi sia presenza di pazienti/utenti e/o altro personale	<ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica
PERSONALE CHE EFFETTUA LA PULIZI E L'IGIENIZZAZIONE (AMBULANZE O LOCALI CONTAMINATI)	
<p>1- Attività in presenza di paziente sospetto o accertato COVID-19</p> <p><i>Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Copricapo monouso - Mascherina chirurgica o facciale filtrante FFP2* - Sovracamice - Sovrascarpe¹ - Occhiali protettivi a visiera - Doppi guanti in nitrile non sterili monouso <p><i>*Utilizzare il facciale filtrante FFP2 in luogo della mascherina chirurgica solo se la pulizia ed igienizzazione del locale viene effettuata in presenza di paziente sottoposto a procedure che generano aerosol.</i></p>
2- Attività in assenza di paziente	<ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica per l'operatore sanitario

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria	Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro	Rev. 3
	ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA	Data 01/06/2020
	RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_	Pagina 10 di 12

	<ul style="list-style-type: none"> - Sovracamiche - Sovrascarpe¹ - Doppi guanti in nitrile non sterili monouso
PERSONALE CHE UTILIZZA I MEZZI AZIENDALI	
Utilizzo mezzi aziendali	<ul style="list-style-type: none"> - Mascherina chirurgica durante tutto il viaggio <i>Esequire l'igiene delle mani prima di salire a bordo del mezzo</i>

Note:

1. Il sovrascarpe non è da considerarsi un dispositivo di protezione individuale pertanto non è strettamente indispensabile nell'assistenza.
2. Utilizzare la mascherina chirurgica per l'assistenza al paziente COVID-19 laddove non vengono eseguite procedure che generano aerosol sul paziente assistito o su altri pazienti presenti nella stessa area o reparto e in generale dove non vi sia un'elevata attività assistenziale su pazienti COVID-19.
3. Nei reparti COVID-19 ove si presume vi sia una elevata attività assistenziale ed una prolungata esposizione al rischio, anche al fine di razionalizzare l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è opportuno utilizzare il facciale filtrante FFP2 o FFP3 per tutta la durata dell'attività assistenziale, su tutti i pazienti.
4. Per gli operatori non impegnati nell'assistenza e che operano nei locali non contaminati ad uso esclusivo del personale è indicato l'utilizzo della mascherina chirurgica. Anche in questi contesti la mascherina chirurgica deve essere indossata correttamente e non manipolata. Laddove necessaria la presenza in uno stesso locale di più di un operatore, mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Il facciale filtrante almeno FFP2 è indicato anche al di fuori dell'assistenza, nei contesti ove vi sia una possibile esposizione ad aerosolizzazione ed in generale, per un razionale utilizzo dei dispositivi di protezione, ove lo stesso personale operi prima in aree non contaminate e poi in aree contaminate durante lo stesso turno lavorativo, fatto salvo che al termine dell'attività assistenziale e passando dalle aree contaminate a quelle non contaminate il facciale filtrante deve essere sostituito.
5. Il personale che svolge attività ispettive di vigilanza sul territorio deve utilizzare sempre la mascherina chirurgica pur mantenendo, ove possibile, una distanza interpersonale di almeno 1mt.
6. Procedure che generano aerosol a rischio elevato: intubazione ed estubazione endotracheali, ventilazione oscillatoria ad alta frequenza, ventilazione con pallone ambu, broncoscopia e lavaggio broncoalveolare, laringoscopia, ventilazione a pressione positiva (BiPAP e CPAP), autopsia del tessuto polmonare, lavaggio nasofaringeo, aspirazione e scopia, induzione dell'espettorato, tampone nasofaringeo.

Altre procedure a rischio che generano aerosol: aspirazione delle vie aeree, ossigeno ad alto flusso (inclusi allestimenti O2 singoli e doppi, Optiflow e Airvo), interruzione del sistema di ventilazione chiuso intenzionalmente (ad esempio aspirazione aperta) o involontariamente (ad esempio movimento del paziente),

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria	Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro	Rev. 3
	ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA	Data 01/06/2020
	RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_	Pagina 11 di 12

rianimazione cardiopolmonare (CPR), tracheostomia, fisioterapia toracica (dispositivo per la tosse manuale e meccanico – MI-E), somministrazione di farmaci in aerosol o nebulizzanti, irrigazione di ascessi / ferite (esclusi pazienti con tubercolosi polmonare).

Indicazioni generali:

- Il presente protocollo di utilizzo dei dispositivi di protezione è specifico per il rischio COVID-19. Resta inteso pertanto che i dispositivi di protezione previsti per le specifiche attività assistenziali, qualora diversi, vanno ad aggiungersi o, se di livello superiore, a sostituirsi a quanto qui indicato.
- I dispositivi di protezione oculare pluriuso (schermo facciale e occhiali protettivi) devono essere ricondizionati dopo ogni utilizzo, decontaminandoli con salviette GIOCLOR WIPES o con pannetti monouso e soluzione di GIOCLOR al 10% (100 ml di prodotto + 900 ml di acqua per 5 min di contatto) prima di collocarli in un sacchetto/contenitore pulito.
- L'utilizzo del facciale filtrante FFP2 o FFP3 con valvola da parte dell'operatore sanitario è consentito solo nell'assistenza dei pazienti COVID-19. In tutti gli altri contesti utilizzare facciali filtranti FFP2 o FFP3 senza valvola. Se disponibili solo facciali filtranti con valvola, indossare sopra a questi, una mascherina chirurgica. In questo caso la frequenza di sostituzione del facciale filtrante rimane comunque invariata. Il facciale filtrante FFP2 o FFP3 con valvola non deve essere fatto utilizzare al paziente.
- Nelle procedure che generano aerosol il facciale filtrante FFP3 è indicato prioritariamente nelle attività a rischio elevato (vedi NOTA6).
- I Dispositivi di Protezione devono essere indossati in un locale "pulito" e rimossi o all'interno della stanza del paziente COVID-19 o all'interno di un locale appositamente identificato a tale scopo, a seconda dell'organizzazione che è stata definita all'interno del reparto, anche in relazione alle caratteristiche strutturali dello stesso. È fatto divieto di uscire dai reparti/aree ove vi sono pazienti COVID-19 sospetti o accertati con i Dispositivi di Protezione utilizzati all'interno del reparto/area. È fatto divieto di recarsi negli spogliatoi con i Dispositivi di Protezione utilizzati nei reparti/aree COVID-19. L'accesso agli spogliatoi deve avvenire in modo regolamentato al fine di evitare assembramenti e di garantire sempre la possibilità di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
- La mascherina chirurgica ed i facciali filtranti FFP2/FFP3, ad uso personale, possono essere utilizzati al massimo per la durata di un turno di lavoro e comunque dovranno essere sostituiti quando contaminati da liquidi biologici e/o se manipolati in modo improprio. Prima di indossare e rimuovere i dispositivi di protezione delle vie respiratoria eseguire l'igiene delle mani con gel alcolico o lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.
- Nel caso si debba prestare assistenza a più pazienti con diagnosi accertata di COVID-19, tra un paziente e l'altro sostituire sempre i guanti ed effettuare l'igiene delle mani. Sostituire il sovracamice idrorepellente e/o la mascherina chirurgica/facciale filtrante se bagnati o visibilmente contaminati da materiale biologico.
- Nel caso si debba prestare assistenza a pazienti con sospetta diagnosi di COVID-19, tra un paziente e l'altro sostituire sempre i guanti ed effettuare l'igiene delle mani. Sostituire il sovracamice idrorepellente e/o la mascherina chirurgica/facciale filtrante se bagnati o visibilmente contaminati da materiale biologico e comunque sostituire sempre il sovracamice in caso di contatto diretto con il paziente.

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p>Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio Sorveglianza Sanitaria</p>	Sistema di Gestione e Sicurezza sul Lavoro	Rev. 3
	ASSEGNAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DISPOSITIVI BARRIERA RISCHIO BIOLOGICO COVID-19 SGSL-DPI-DM-COVID-19-01_	Data 01/06/2020
		Pagina 12 di 12

- Nel caso si debba prestare assistenza ad un paziente con sospetta diagnosi di COVID-19 e ad un paziente con accertata diagnosi di COVID-19, cominciare l'assistenza dal caso sospetto e tra un paziente e l'altro sostituire sempre i guanti ed effettuare l'igiene delle mani. Sostituire il sovracamice e la mascherina chirurgica/facciale filtrante se bagnati o visibilmente contaminati da materiale biologico.
 - Laddove indicato l'uso del sovracamice, lo stesso deve essere sostituito tra un paziente e l'altro nel caso vi sia stato un contatto diretto. In caso di prestazioni che non richiedono un contatto diretto con il paziente, il sovracamice può essere utilizzato per l'intero turno di lavoro.
 - Laddove si verificasse una carenza temporanea di dispositivi di protezione individuale utilizzare i dispositivi disponibili di livello superiore (ad esempio facciale filtrante in luogo della mascherina chirurgica, tuta in luogo del sovracamice idrorepellente).
 - I dispositivi di protezione utilizzati nell'assistenza dei pazienti COVID-19 (sospetti o accertati) devono essere eliminati nel contenitore dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo. In generale i dispositivi di protezione utilizzati nell'assistenza di tutti i pazienti, se visibilmente contaminati e/o se il contatto con il paziente/utente è stato stretto e prolungato devono essere eliminati nel contenitore dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo; se non visibilmente contaminati, devono essere eliminati nel contenitore dei rifiuti indifferenziati.
- Nell'assistenza domiciliare di tutti i pazienti, per semplicità di gestione, i dispositivi di protezione utilizzati devono sempre essere eliminati nel contenitore dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo.
- Il presente protocollo è stato definito secondo un principio di massima prudenza, adottando misure di protezione per il rischio di contagio da contatto e da droplet anche per l'assistenza al paziente asintomatico per COVID-19 e non sottoposto a screening.