

ਐਟੀਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ:-

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨੋਟ:

ਸਪਾਇਕਵੈਕਸ Spikevax (ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਮੋਦੈਰਨਾ)

ਸਪਾਇਕਵੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ

ਸਪਾਇਕਵੈਕਸ ਵੈਕਸੀਨ (ਪਹਿਲਾ ਮੋਦੈਰਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ) ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪਾਇਕਵੈਕਸ ਬਾਲਗ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਇਮੂਨੀਸਿਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਇਹ ਐਟੀਬਾਡੀਸ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਲਾ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਪਾਇਕਵੈਕਸ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।

ਸਪਾਇਕਵੈਕਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:-

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ (ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ)।

ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ) ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ :

- ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਾਂ ਸਪਾਇਕਵੈਕਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ।
- ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ
- ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, (ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜੁਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ)
- ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ(ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰੋਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜਖਮ ਹੋ ਜਾਣਾ) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ(ਗਟਲੀਆ) ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੂਨੀਸਿਟਮ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ (HIV) ਲਾਗ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਇਮੂਨੀਸਿਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡਸ

ਸਪਾਇਕਵੈਕਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੀਕਰੋਬੀਓਲੋਜੀ (ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਜ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰੀਕਾਰੀਟੇ (ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਦੀ ਸੋਜ) ਇਹ ਨੌਰਮਲੀ ਵੈਕਸੀਨ (ਟੀਕਾ) ਲੈਣ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਦ ਇਹ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਵੈਕਸੀਨ (ਡੋਜ) ਤੋਂ ਬਾਦ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿਚ। ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੀਊਕਰੀਟੇ ਅਤੇ ਪੈਰੀਕਰੀਟੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਧੜਕਨ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ , ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।

ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਪਾਇਕਵੈਕਸ:

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ) ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਕਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਰਿਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ

ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਪਾਇਕਵੈਕਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿਧੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ (ਭਰੂਣ ਅਵਸਥਾ, ਸ਼ੀਸੂ ਜਣੇਪੇ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ) ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪਾਇਕਵੈਕਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲਾਭ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ:-

ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਸਟਡੀ (study) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ.ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਇਕਵੈਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ. ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ. ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ (ਮਾਸਕ, ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ) ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਸਪਾਇਕਵੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ :-

ਸਪਾਇਕਵੈਕਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਭਾਗ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹੈ.ਟੀਕੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 42 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਿਊਨੀਸਿਟਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹਿਤਰ ਆਵੇ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨੋਸੋਪਰੈਸਿਊਨ (immunosoppressione)ਦੇ ਹਲਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਇਕ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਨਿਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਇਕ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ EMA (ਏਜੰਸੀ ਈਰੋਪਾ ਚੈਲ ਫਾਰਮਕੋ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀ ਸਪਾਇਕਵੈਕਸ (AIFA) ਨੇ ≥ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 648/961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ.

ਸਪਾਇਕਵੈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਨੇ ਵੈਕਸਜੇਵਰੀਆ (Vaxzevria) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ 8 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਸੀ. ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸੰਕੋਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ . ਪਰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀ (AIFA) ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਨੰਬਰ **0026246- 11/06/2021- DGPRE** ਨੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ . ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 648/961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸਜੇਵਰੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੈ .ਇਸਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨੀਕਲ ਡਾਟਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਡ-ਅਫੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਗ (ਡਿਫਰੈਂਟ) ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਹੈ.

ਸਾਈਡ-ਅਫੈਕਟ /ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ :-

ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਾਇਕਵੈਕਸ ਸਾਈਡ-ਅਫੈਕਟ (ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ **ਤਰੁੱਤ** ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ

- ਬੇਹੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਰ ਚੱਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣਾ
- ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣਾ
- ਜੀਭ, ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ
- ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਧੱਫੜ ਪੈਣਾ
- ਮਨ ਮਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆ
- ਪੇਟ ਦਰਦ

ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜੇ(ਗਲਤ) ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:-

ਬਹੁਤ ਆਮ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ(10 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)

- ਕੱਛਾ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਦਰਦ
- ਸਿਰ ਦਰਦ
- ਮਨ ਮਚਲਾਉਣਾ
- ਉਲਟੀ

- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਵਿਚ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦ
- ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਉਪਰ ਦਰਦ ਜਾ ਸੋਜ

¹ La Legge n. 648/96 consente ai medici l'utilizzo a carico del SSN di farmaci che si sono dimostrati efficaci e sicuri nel trattamento di una determinata patologia, ma che non sono autorizzati per quella specifica indicazione terapeutica.

ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 648/96 ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦਵਾਈਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਿਖਾਈਆ ਗਈਆ ਹਨ ਪਰ ਜੋ 'SSN (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕੇਤ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀ ਹਨ

- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ
- ਠੰਡ ਨਾਲ ਕੰਬਣਾ
- ਬੁਖਾਰ

ਆਮ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ (10 ਵਿਚੋ 1 ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)

- ਧੱਫੜ
- ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਉਪਰ ਲਾਲੀ ਜਾ ਖਾਜ (ਇਹੋ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿਚ ਉਹ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇ ਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਅਸਧਾਰਨ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ (100 ਵਿਚੋ 1 ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)

- ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਇਡ ਤੇ ਖੁਜਲੀ

ਦੁਰਲਭ (rare) ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ (1000 ਵਿਚੋ 1 ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ):

- ਕੁਝ ਸਮੇ ਲਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿਸੇ ਦਾ ਅੰਧਰਗ ਹੋਣਾ (ਬੈਲ ਅੰਧਰਗ)
- ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੋਜ (ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੋਜ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਹਨ
- ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
- ਛੋਹਣ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ

ਕਹਿ ਨਹੀ ਸਕਦੇ (ਹੇਠਾ ਲਿਖੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ (ਆਨਾਫੀਲਾਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਗਭੀਰ ਅਲੈਰਜੀ ਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾ
- ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮੂਨੀਸਿਸਟਮ ਦੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾ
- ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਜਸ (ਮੀਉਕਰਦੀਤੇ) ਜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਦੀ ਸੋਜਸ (ਪੇਰੀਕਾਰਦੀਤੇ) ਜੋ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ,ਧੜਕਨ ਜਾ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਪਰ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ

(<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>). .

ਸਪਾਈਕਵੈਕਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ

ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਇਕ ਐਂਟੀ-ਕੋਵਿਡ-19 (Anti-covid-19) mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ

ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ:- ਲੀਪੀਦੇ SM-102 ,ਕੋਲੇਸਤੇਰੋਲੋ 1.2- ਡਿਸਤੇਅਰੋਇਲ - sn - ਗਲੀਸੇਰੋ - 3- ਫੋਜਫੋਕਾਲੀਨਾ (DSPC), 1.2- ਦੀਮਿਰਿਸਤੇਇਲ-rac-ਗਲੀਸੇਰੋ-3-ਮੇਤੋਸੀਪੋਲੀਏਤੀਲਿਨਗਲੀਕੋਲੋ - 2000 (PEG 2000 DMG), ਤਰੋਮੇਤਾਮੋਲੋ, ਤਰੋਮੇਤਾਮੋਲੋ ਕਲੋਰੀਦਰਾਤੋ, ਅਸੀਦੋ ਅਸ਼ੇਤੀਕੋ, ਸੋਡਿਓ ਆਸ਼ੇਤਾਤੋ ਤਰੀਦਰਾਤੋ, ਸਾਕਾਰੋਸੀਓ,ਟੀਕੋ ਲਈ ਪਾਣੀ

Gli altri componenti sono: lipide SM-102, colesterolo, 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC), 1,2-dimiristoil-rac-glicero-3-metossipolietilenglicole-2000 (PEG2000 DMG), trometamolo, trometamolo cloridrato, acido acetico, sodio acetato triidrato, saccarosio, acqua per preparazioni iniettabili.