

## قولونو سکوپي ٹيسٹ: تياري کيسے کرنی ہے

قولونوسکوپي ٹيسٹ کا اچھا رزلٹ حاصل کرنے کے لیے صحیح تياري کرنا نہایت ضروری ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کریں۔

### آنتوں کی صفائی

آنتوں کی اچھی صفائی کے لیے ان میں سے اپنی پسند کی ایک دوا خریدیں: PLENVU، MOVIPREP، CLENSIA، اور دوا کے ساتھ دیے گئے ہدایات والے صفحے کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر دھیان سے عمل پیرا ہوں، اور پینے کے لیے ایک محلول تیار کریں اور یہاں بتائے ہوئے ٹائم میں سارا پی لیں۔ پہلا ڈوز پینے کے تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد پاناخانہ آنا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ یہ پتلا ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ یہ صاف ہو جائے گا: یہ آنتوں کی اچھی صفائی کی علامت ہے۔

### ٹيسٹ سے ایک دن پہلے

- سلیگ فری ڈائنٹ شروع کریں: چھلکے یا بیج والے فروٹ، سبزی، سلاد، چاول، دالیں اور بغیر چھانٹے ہوئے اناج سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال مت کریں
- پاستہ، بریڈ، گوشت، مچھلی، انڈہ، آلو اور گاجر کھائے جا سکتے ہیں
- دن میں کم از کم 2 لیٹر پانی لازمی پینا ہے
- آنتوں کی صفائی شروع کرنے کے بعد ٹھوس غذا کا استعمال نہ کریں

### ٹيسٹ والے دن

- اگر ٹيسٹ صبح کے وقت مقرر کیا گیا ہے، تو آپ آدھی رات کے بعد کھانے پینے سے پرہیز کریں۔
- اگر ٹيسٹ بعد از دوپہر (دن 2 بجے کے بعد) مقرر کیا گیا ہے، تو آپ ہلکا ناشتہ کرسکتے ہیں اور اس کے بعد جب تک ٹيسٹ نہیں ہوجاتا، اس وقت تک کھانے پینے سے پرہیز کریں۔
- آپ ٹيسٹ سے 2 گھنٹے پہلے تک صاف پانی اور مائع (چائے، کیموٹائل) پی سکتے ہیں۔

### آنتوں کی صفائی کے لیے محلول کا استعمال کيسے کرنا ہے

آپ اپنی مرضی کے مطابق ان میں سے کسی 1 مصنوعات کا انتخاب کرسکتے ہیں:

#### PLENVU

##### صبح کے وقت مقرر کردہ ٹيسٹ

ٹيسٹ سے ایک دن پہلے:

- پہلا ڈوز شام 6.00 بجے سے 6.30 بجے کے درمیان پی لیں
- شام 6.30 بجے سے 7.30 بجے تک 1 لیٹر پانی پی لیں
- رات کے کھانے میں سوپ یا صاف مائع پی سکتے ہیں

ٹيسٹ والے دن:

- ناشتہ نہیں کر سکتے
- ٹيسٹ سے 4 گھنٹے پہلے، 30 منٹ میں دوسرا ڈوز

#### CLENSIA یا MOVIPREP


##### صبح کے وقت مقرر کردہ ٹيسٹ

ٹيسٹ سے ایک دن پہلے:

- پہلا ڈوز شام 6.00 بجے سے 7.00 بجے کے درمیان پی لیں
- شام 7.00 بجے سے 8.00 بجے تک 1 لیٹر پانی پی لیں
- رات کے کھانے میں سوپ یا صاف مائع پی سکتے ہیں

ٹيسٹ والے دن:

- ناشتہ نہیں کر سکتے
- ٹيسٹ سے 4 گھنٹے پہلے، 30 منٹ میں دوسرا ڈوز



<b>PLENVU</b>	<b>MOVIPREP یا CLENSIA</b>
<p><b>دوپہر 2 بجے سے بعد مقرر کردہ ٹیسٹ</b></p> <p><b>ٹیسٹ والے دن :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ہلکا ناشتہ کر سکتے ہیں</li><li>• دوپہر کا کھانا نہیں کھا سکتے</li><li>• پہلا ڈوز صبح 7.00 بجے سے 7.30 بجے کے درمیان پی لیں</li><li>• صبح 7.30 بجے سے 8.30 بجے تک 1 لیٹر پانی پی لیں</li><li>• ٹیسٹ سے 4 گھنٹے پہلے ، 30 منٹ میں دوسرا ڈوز پی لیں</li></ul>	<p><b>دوپہر 2 بجے سے بعد مقرر کردہ ٹیسٹ</b></p> <p><b>ٹیسٹ والے دن :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ہلکا ناشتہ کر سکتے ہیں</li><li>• دوپہر کا کھانا نہیں کھا سکتے</li><li>• پہلا ڈوز صبح 7.00 بجے سے 8.00 بجے کے درمیان پی لیں</li><li>• صبح 8.00 بجے سے 9.00 بجے تک 1 لیٹر پانی پی لیں</li><li>• ٹیسٹ سے 4 گھنٹے پہلے ، ایک گھنٹے میں دوسرا ڈوز پی لیں</li></ul>

### ہدایات اور مزید معلومات

- اگر آپ فیویزم یا فینیل کیٹونوریا کا شکار ہیں تو ، جس کلینک میں آپ کا علاج ہونا ہے وہاں کے گیسٹر وانٹرالوجیسٹ کو آگاہ کریں ، وہ آپ کو آنتوں کی صفائی کے لیے مناسب دوا تجویز کرے گا
  - اگر آپ حاملہ ہیں تو جس کلینک میں آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے ، وہاں رابطہ کریں اور گیسٹر وانٹرالوجیسٹ کو آگاہ کریں
  - اگر آپ کا وزن 100 کلو گرام سے زیادہ ہے یا آپ کو رات کو سوتے وقت سانس کا پرالہم ہوتا ہے یا آپ گھر میں آکسیجن تھراپی کا استعمال کر رہے ہیں تو، جس کلینک میں آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے ، وہاں رابطہ کریں اور گیسٹر وانٹرالوجیسٹ کو آگاہ کر دیں
  - اگر آپ کو لیٹیکس سے الرجی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو الرجی ہے ، تو اس ہسپتال سے رابطہ کریں جہاں آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے ، طبی عملے سے بات کریں۔
  - اگر آپ دوائیاں لے رہے ہیں تو ، محلول پینے کے ایک گھنٹے بعد ٹیسٹ کی صبح ، آپ عام طور پر تھراپی لے سکتے ہیں (جیسے اینٹی بائی بلڈ پریشر ، قلبی امراض)
  - اگر آپ اینٹی کوگیولنٹ ، اینٹی ایپلیٹ ایجنٹ ، انسولین یا ذیابیطس کے علاج کے لیے دوائیاں استعمال کر رہے ہیں تو ، ٹیسٹ سے کم از کم 7 دن پہلے اپنے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کریں یاد رکھیں یہ ساتھ لانے ہیں:
  - ٹیسٹ کے لیے ڈاکٹر کا نسخہ (جس پر تجویز کردہ ٹیسٹ تحریر ہو )  
- قولونوسکوپ کے متعلق ممکنہ طور پر پہلے کیے گئے ٹیسٹ کی رپورٹس یا ماہر ڈاکٹر سے چیک اپ کی رپورٹ  
- ممکنہ طور پر زیر استعمال ادویات کی لسٹ
  - h. کسی بھی سوال کی صورت میں یا معلومات لینے کے لیے ڈائجیسٹیو اینڈوسکوپ سروس سے رجوع کریں
- انتباہ!** عام طور پر کولونوسکوپ سے ہوشی کی حالت میں کی جاتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ آپ کسی بالغ کو ساتھ لائیں جو گاڑی چلا سکتا ہو۔
- اس ہسپتال سے رابطہ کرنے کے لیے جہاں ٹیسٹ کیا جانا ہے ، ویب سائٹ پر رابطہ کی تفصیلات دیکھیں: [www.ausl.mo.it/endoscopy](http://www.ausl.mo.it/endoscopy)
- یا اپنے موبائل فون کے ساتھ یہاں QR کوڈ اسکین کریں۔

