

Patologie croniche cardiovascolari nelle persone di 18-69 anni

Sorveglianza PASSI. Emilia-Romagna 2008-12


Le patologie cardiovascolari sono le malattie croniche più frequenti dopo le patologie respiratorie

In Emilia-Romagna il 4,8% delle persone 18-69enni ha riferito una diagnosi di malattia cronica cardiovascolare (pregresso infarto del miocardio, ischemia cardiaca, malattie delle coronarie, alte malattie del cuore e ictus o ischemia cerebrale); questa stima corrisponde in Regione a circa 143 mila persone coinvolte nella cronicità.

Il dato regionale è uguale a quello nazionale (4,8%, corrispondente circa 2 milioni di persone con patologia cronica cardiovascolare).

Presenza di almeno una patologia cardiovascolare cronica Emilia-Romagna PASSI 2008-12						
	Genere		Classe d'età			Totale
	Uomini	Donne	18-34 anni	35-49 anni	50-69 anni	
Prevalenze	5,9%	3,7	1,5	2,5	9,5	4,8
Popolazione stimata	87.850	55.370	11.850	27.750	105.620	143.220

Presenza di patologia cardiovascolare cronica per classe d'età (%)
PASSI 2008-12




La compresenza con altre patologie croniche interessa un terzo delle persone affette da malattia cardiovascolare

Tra le persone con patologia cronica cardiovascolare il 29% dichiara una diagnosi di un'altra malattia cronica, pari a una stima di circa 40mila persone in Regione.

In particolare:

- il 19,1% ha avuto diagnosi anche di una malattia respiratoria*
- l' 11,2% di tumore
- il 14,1% di diabete
- il 4,8% di una malattia cronica del fegato**
- il 4,9% di insufficienza renale.

Presenza di altre malattie croniche nelle persone con patologia cardiovascolare cronica (%)
PASSI 2008-12



Presenza di altre patologie croniche nelle persone con patologia cardiovascolare cronica
PASSI 2008-12

	Popolazione stimata	
	Emilia-Romagna	Italia
Malattie respiratorie	27.000	394.000
Tumore	16.000	177.000
Diabete	20.000	361.500
Malattie epatiche	7.000	104.000
Insufficienza renale	7.000	145.000

* Bronchite cronica, enfisema, insufficienza respiratoria, asma bronchiale.


** Rilevata dal 2010

Le patologie respiratorie sono più frequenti nelle persone svantaggiate dal punto di vista socio-economico

La prevalenza di patologie cardiovascolari croniche è più alta nella fascia d'età 50-69 anni, negli uomini, nelle persone con livello d'istruzione basso, difficoltà economiche e cittadinanza italiana.

Nel modello di regressione logistica condotto per correggere l'influenza dei diversi fattori tra di loro, la prevalenza di patologie cardiovascolari croniche si conferma associata con le classi d'età 35-49 anni e 50-69 anni, il basso livello d'istruzione, la presenza di molte difficoltà economiche e la cittadinanza italiana.


* Italiani: persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA);
Stranieri: persone immigrate da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM)



La qualità della vita peggiora sensibilmente, in particolare nelle persone svantaggiate sotto il profilo socio-economico

Nelle persone con diagnosi di patologia cronica cardiovascolare la qualità della vita peggiora sensibilmente: solo il 34% ha riferito di stare bene o molto bene rispetto al 63% delle persone senza patologie.

La prevalenza di persone con patologia cronica cardiovascolare che hanno una cattiva percezione del proprio stato di salute risulta maggiore nelle persone con bassa istruzione e con difficoltà economiche.




La presenza di sintomi di depressione è più frequente nelle persone con patologia cronica cardiovascolare, soprattutto nelle donne e nelle persone con basso livello socio-economico

Tra le persone di 18-69 anni con patologia cronica cardiovascolare il 14% ha riferito sintomi di depressione; questa percentuale risulta significativamente maggiore rispetto a chi non ne ha (7%), in ogni classe d'età.

La prevalenza di persone con patologia cronica con sintomi di depressione è maggiore tra:

- i 35-49enni (14%)
- le donne (16%)
- le persone con bassa istruzione (13%)
- le persone con difficoltà economiche (16%).




L'ipertensione e l'ipercolesterolemia sono più frequenti sopra ai 50 anni e nelle persone svantaggiate sotto il profilo socio-economico

In Emilia-Romagna oltre la metà (54%) delle persone 35-69enni con patologia cronica cardiovascolare riferisce una diagnosi di ipertensione arteriosa, pari a una stima di circa 72mila persone; la prevalenza nazionale è statisticamente superiore (64%, pari a una stima di 1 milione e 110 mila persone).


Circa metà (52%) delle persone 35-69enni con patologia cronica cardiovascolare riferisce una diagnosi di ipercolesterolemia, pari a una stima di circa 69 mila persone; la prevalenza è statisticamente inferiore (48% pari a una stima di 890 mila persone).

La presenza di ipertensione e ipercolesterolemia sono, come atteso, significativamente più alte rispetto a quella nelle persone senza patologia cardiovascolare.

Ipertensione nelle persone con patologia cardiovascolare cronica per classi d'età (%)
PASSI 2008-12



Ipercolesterolemia nelle persone con patologia cardiovascolare cronica per classi d'età (%)
PASSI 2008-12




Nelle persone con patologia cardiovascolare il trattamento della ipertensione e dell'ipercolesterolemia è più frequente

L'attenzione dei sanitari, coerentemente con quanto atteso, è maggiore nei confronti delle persone con patologia cardiovascolare cronica: la maggior parte di queste persone ha infatti ricevuto trattamenti preventivi o farmacologici sia per l'ipertensione sia per l'ipercolesterolemia.


La maggior parte (89%) delle persone con patologie cardiovascolari e ipertese ha riferito almeno due interventi di controllo della pressione arteriosa, senza differenze significative per classe d'età, genere, istruzione e difficoltà economiche.

La maggior parte (82%) delle persone con una patologia cardiovascolare cronica e ipercolesterolemia ha riferito almeno tre interventi di controllo della colesterolemia, senza differenze significative per classe d'età, genere, istruzione e difficoltà economiche.

Controllo della pressione arteriosa nelle persone 35-69enni (%)
Emilia-Romagna, PASSI 2008-12




Controllo della colesterolemia nelle persone 35-69enni (%)
Emilia-Romagna, PASSI 2008-12



Le persone con patologia cronica cardiovascolare sono più spesso sedentarie e in eccesso ponderale

Presenza di fattori di rischio


Emilia-Romagna, PASSI 2008-12



Nelle persone svantaggiate sono più frequenti fumo, eccesso ponderale e sedentarietà

Presenza di fattori di rischio nelle persone con patologia cronica cardiovascolare per livello socio-economico*


Emilia-Romagna, PASSI 2008-12



La sedentarietà è significativamente meno diffusa in Emilia-Romagna rispetto alla media nazionale

Presenza di fattori di rischio nelle persone con patologia cronica cardiovascolare


PASSI 2008-12



L'attenzione dei sanitari agli stili di vita è migliorabile

Consigli degli operatori sanitari alle persone con patologia cronica cardiovascolare

Emilia-Romagna, PASSI 2008-12



* Livello basso = bassa istruzione e difficoltà economiche

Livello medio = bassa istruzione e assenza di difficoltà economiche oppure alta istruzione e difficoltà economiche

Livello alto = alta istruzione e assenza di difficoltà economiche

A cura del Gruppo Tecnico PASSI Emilia-Romagna :

Nicoletta Bertozzi, Giuliano Carrozzì, Letizia Sampaolo, Lara Bolognesi, Laura Sardonini, Federica Balestra, Anna Rita Sacchi, Alma Nieddu, Anna Maria Ferrari, Natalina Collina, Sara De Lisi, Ivana Stefanelli, Aldo De Togni, Giuliano Silvi, Cristina Raineri, Oscar Mingozzi, Patrizia Vitali, Michela Morri, Rossana Mignani, Paola Angelini, Alba Carola Finarelli

Per maggiori informazioni consulta il report www.ausl.mo.it/dsp/disuguaglianzeconomiche