

HEPATITI B - EPATITE B

Hepatiti B është një sëmundje ngjitëse që prek melcine; është e shkaktuar nga një mikroorganizëm i quajtur virus i hepatitit B që transmetohet nepermjet gjakut dhe raporteve seksuale. Në fakt virusi është present në gjak dhe në të tjera lëngje biologjike, në mënyrë të veçantë në spermë dhe në sekrezionet vagjinale të personave të sëmurë ose mbartës kronik. Këto të fundit janë persona që, edhe në mungesë të sëmundjes, përmbajnë agjentin infektiv dhe mund ta transmetojnë personave të tjerë. Janë shumë më të rrezikshëm se të sëmurët sepse shpesh nuk njohin konditën e tyre dhe prandaj nuk janë në gjendje të veprojnë për të shmangur infektimin.

Numeri i mbartësve të virusit në Vendet e Afrikës, të Azi-së, të Lindjes së Mesme, të Europës së lindjes dhe të qendrës dhe të jugut të Amerikës është shumë i lartë, duke tejkaluar në disa zona 10% e të gjithë popullsisë.

Në pjesën më të madhe të këtyre zonave, rastet më të shpeshta të infektimit ndodhin në fëmijet, në të cilët është shumë më e lehtë se në të rriturit që sëmundja të bëhet kronike. Një situatë shumë e rëndë është e përbërë nga transmetimi i virusit nga nëna në fëmijë gjatë shtatzënisë dhe sidomos në momentin e lindjes.

SI SHFAQET SEMUNDJA

Pas një periudhe kohe të ndryshueshme nga 2 deri në 6 muaj nga momenti që ka ndodhur ngjitja, shfaqen simptomat tipike të sëmundjes që janë: lodhje, humbja e oreksit, ikter (ngjyrosja e verdhë e mukozave), ngjyrosja e erret të urinës dhe ngjyrosja e hapur e jashtëqitjes, temperatura. Kjo është një tabllo tipike e sëmundjes (që nuk është e ndryshme nga hepatitet e tjera kronike) por ajo mund të paraqitet në mënyrë të ndryshme të cilat mund të jenë o formë të lehtë pa simptoma të dukshme ose raste ku melcia është e prekur në mënyrë të rëndë.

Hepatiti B në rastet më të shumta shërohet por ndonjë herë bëhet kronike, duke u transformuar në epatit kronik, cirrozi, tumor në melcë. Berja kronike e sëmundjes mesatarisht ndodh në 5.10% të rasteve edhe në të ndryshme të mëdha në lidhjen me moshën e të sëmurit (90% në të porsalindurit, 20-50% në fëmijet deri në 5 vjeç, 1-10% sipër 5 vjeç).

CFARE DUHET TË BEHET PËR TË PARANDALUAR HEPATITIN B

Parandalimi i hepatitit B bazohet kryesisht mbi adoptimin e sjelljeve të drejta dhe vaksinimit.

Sidoqoftë duhet të shmangët përzjerja seksuale (të kesh shumë partner seksual në të njëjtën kohë), raportet seksuale të rastesishëm pa përdorur prezervativin, dhe përdorimi i përbashkët i shiringave.

Në qoftë se je mbartës i virusit:

- njofto partnerin tënd dhe bashkëjetuesit tuaj për ekzistencën e një vaksine të dobishme dhe të sigurtë që mund t'ju jepet pa pagesë,

- perdor ne menyre perjashtimore dhe personale furçet e dhembeve, gersheret per thonj, brisk rroje dhe çdo instrument i mprehte per manikyr,
 - ne qofte se perdor shiringa per te marr ilaçe ose droge mos i braktis pas perdorimit por eliminoj ne menyre qe te mos demtoje persona te tjere,
 - ne qofte se je ne shtatzeni njofto gjinekologun tend ne menyre qe te merren te gjitha masat parandaluese, qe jane zbuluar te dobishme, per te mbrojtur femijen.
- Ne qofte se deshiron informacione te tjera mbi hepatitin B ose deshiron te besh vaksinen drejtohu Sherbimit te Higjenes Publike qe ke me afer.
- Ne qofte se je i interesuar te besh kontrollet per te pare se je apo jo i infektuar drejtohu mjekut tend.

I azhurnuar ne Qeshor 2003 / Aggiornato al Giugno 2003

I perkthyer nga Kooperativa INTEGRA / Tradotto da Cooperativa INTEGRA

Me kontibutin e Provinces se Modena / Con il contributo della Provincia di Modena

Per te ditur me teper drejtohuni ne:

Per saperne di più rivolgersi a: