



La copertura della vaccinazione antinfluenzale nelle persone con patologie croniche in Emilia-Romagna: dati delle sorveglianze PASSI (anni 2010-13) e PASSI d'Argento (anno 2012)

La copertura della vaccinazione antinfluenzale

In Emilia-Romagna la **copertura vaccinale complessiva per l'antinfluenzale**, cioè la percentuale di persone che hanno effettuato la vaccinazione, cresce, come ci si può aspettare, con l'età: 5% tra i 18-34enni, 8% tra i 35-49enni, 21% tra i 50-64enni e 64% tra gli ultra 64enni.

La copertura è significativamente più alta tra le persone con **patologie croniche** in tutte le fasce d'età considerate.

Nella **fascia 18-64 anni** la copertura è maggiore tra le persone con malattie cardiache e diabete (rispettivamente il 32% e 31%), mentre è più bassa tra chi presenta malattie croniche del fegato (15%) o ha avuto un ictus o un'ischemia cerebrale (13%).


La copertura vaccinale tra i 18-64enni con patologie cresce con l'età ed è più alta tra le persone con basso livello d'istruzione.

Analizzando le variabili del grafico in un modello di regressione logistica, per correggere l'influenza dei diversi fattori tra di loro, l'esecuzione della vaccinazione antinfluenzale tra i cronici si conferma associata all'età e al livello d'istruzione.


Tra le Aree Vaste regionali non sono emerse differenze statisticamente significative della copertura vaccinale tra i cronici di 18-64 anni.

Nel periodo 2008-13 la copertura vaccinale delle persone di 18-64 anni affette da patologie croniche decresce negli anni: si passa dal 31% nella campagna vaccinale 2007-08 al 16% in quella 2012-13.


Copertura della vaccinazione antinfluenzale nelle persone di 18-64 anni con patologie croniche per campagna vaccinale (%) Emilia-Romagna, PASSI 2010-13




Copertura della vaccinazione antinfluenzale per classe d'età tra le persone con/senza patologie croniche (%) Emilia-Romagna, PASSI 2010-13 (18-64 anni) e PASSI d'Argento 2012 (65 anni e oltre)



Copertura della vaccinazione antinfluenzale per tipo di patologia cronica nelle persone di 18-64 anni (%) Emilia-Romagna, PASSI 2010-13



Copertura della vaccinazione antinfluenzale nelle persone di 18-64 anni con patologia cronica per caratteristiche socio-demografiche (%) Emilia-Romagna, PASSI 2010-13



* Italiani: persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA);
Stranieri: persone immigrate da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM)


Secondo i dati PASSI d'Argento la copertura vaccinale tra le **persone ultra 64enni** è pari al 64,3%, mentre tra quelle **con patologie croniche** è superiore in quelle con insufficienza renale o malattia cronica cardiaca (78%) e inferiore in quelle con tumori (69%). È addirittura inferiore alla media in chi è affetto da insufficienza renale (53%).

Anche la copertura vaccinale tra gli ultra 64enni con patologie aumenta con l'età ed è più alta tra le persone con basso livello d'istruzione o in cattive condizioni di salute.


Analizzando le variabili del grafico in un modello di regressione logistica, per correggere l'influenza dei diversi fattori tra di loro, l'esecuzione della vaccinazione antinfluenzale tra i cronici si conferma associata in modo significativo solamente all'età.

Non sono emerse differenze statisticamente significative tra le Aree Vaste regionali anche nella copertura vaccinale tra le persone ultra 64enni con patologie croniche.


Copertura della vaccinazione antinfluenzale per tipo di patologia cronica nelle persone ultra 64enni (%) Emilia-Romagna, PASSI d'Argento 2012



Copertura della vaccinazione antinfluenzale nelle persone di 18-64 anni con patologia cronica per caratteristiche socio-demografiche (%) Emilia-Romagna, PASSI d'Argento 2012




Copertura della vaccinazione antinfluenzale tra le persone con patologie croniche per Aree Vaste regionali (%) PASSI 2010-13 (18-64 anni) e PASSI d'Argento 2012 (65 anni e oltre)



Il 78% delle persone ultra 64enni con patologie croniche ha riferito di aver ricevuto il **consiglio** da parte del medico di famiglia di vaccinarsi contro l'influenza stagionale.

Questa percentuale è più alta tra chi soffre di insufficienza renale (87%) o di malattie cardiache (83%) o ha avuto un ictus o un'ischemia cerebrale (84%); si registra un valore più basso tra chi ha avuto diagnosi di tumori (77%) o di patologia epatica (71%).

Consiglio medico di vaccinarsi contro l'influenza nelle persone ultra 64enni per tipo di patologia cronica (%) Emilia-Romagna, PASSI d'Argento 2012



A cura del Gruppo Tecnico PASSI e PASSI d'Argento Emilia-Romagna: Nicoletta Bertozzi, Giuliano Carrozzi, Letizia Sampaolo, Lara Bolognesi, Laura Sardonini, Federica Balestra, Anna Rita Sacchi, Alma Nieddu, Emilio Marchionni, Anna Maria Ferrari, Natalina Collina, Sara De Lisio, Ivana Stefanelli, Aldo De Togni, Giuliano Silvi, Cristina Raineri, Oscar Mingozzi, Patrizia Vitali, Michela Morri, Rossana Mignani, Maria Grazia Pascucci, Paola Angelini, Alba Carola Finarelli