

Patologie croniche respiratorie nella popolazione di 18-69 anni

Sorveglianza PASSI. Emilia-Romagna 2008-12


Le patologie respiratorie sono le malattie croniche più frequenti

In Emilia-Romagna il 7,9% delle persone 18-69enni ha riferito una diagnosi di malattia cronica respiratoria (bronchite cronica, enfisema, insufficienza respiratoria, asma bronchiale); questa stima corrisponde in Regione a circa 235 mila persone coinvolte nella cronicità.

Il dato regionale è in linea con quello nazionale (7,6%, corrispondente a oltre 3 milioni di persone con patologia cronica respiratoria).

Presenza di almeno una patologia respiratoria cronica Emilia-Romagna, PASSI 2008-12						
	Genere		Classe d'età			Totale
	Uomini	Donne	18-34 anni	35-49 anni	50-69 anni	
Prevalenza	8,0%	7,8%	6,0%	6,6%	10,6%	7,9%
Popolazione stimata	118.200	116.900	46.500	72.400	116.200	235.100

Presenza di patologia respiratoria cronica per classe d'età (%)
PASSI 2008-12




La compresenza con altre patologie croniche interessa un quarto delle persone affette da malattia respiratoria

Tra le persone con patologia cronica respiratoria, il 25% presenta almeno un'altra malattia cronica, pari a una stima di 59 mila persone in Regione.

In particolare:

- l'11,6% ha avuto diagnosi anche di una malattia cardiovascolare*
- l'8,8% di tumore
- il 7,5% di diabete
- il 3,6% di una malattia cronica del fegato**
- il 3,4% di insufficienza renale.

Presenza di altre patologie croniche nelle persone con patologia respiratoria cronica (%)
PASSI 2008-12



Presenza di altre patologie croniche nelle persone con patologia respiratoria cronica
PASSI 2008-12

	Popolazione stimata	
	Emilia-Romagna	Italia
Malattie cardiovascolari	27.000	394.000
Tumori	21.000	217.000
Diabete	18.000	299.000
Malattie epatiche	8.500	149.500
Insufficienza renale	8.000	149.500

* Progresso infarto del miocardio, ischemia cardiaca, malattie delle coronarie, altre malattie del cuore, ictus, ischemia cerebrale (quest'ultime rilevate dal 2011)

** Rilevata dal 2010


Le patologie respiratorie sono più frequenti nelle persone svantaggiate dal punto di vista socio-economico

La presenza di patologie respiratorie croniche è maggiore nelle persone di 50-69 anni, con livello d'istruzione basso, difficoltà economiche e cittadinanza italiana.

Nel modello di regressione logistica condotto per correggere l'influenza dei diversi fattori tra di loro, si confermano le associazioni rilevate.

* Italiani: persone con cittadinanza italiana o provenienti da altri Paesi a Sviluppo Avanzato (PSA);
Stranieri: persone immigrate da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM)

Presenza di patologia cronica per caratteristiche socio-demografiche (%)
Emilia-Romagna, PASSI 2008-12




La qualità della vita peggiora sensibilmente, in particolare nelle persone svantaggiate sotto il profilo socio-economico

Nelle persone con diagnosi di patologia cronica respiratoria la qualità della vita peggiora sensibilmente: solo il 45% ha riferito di stare bene o molto bene rispetto al 70% delle persone senza patologie.

La prevalenza di persone con patologia cronica respiratorie che hanno riferito di stare male o molto male risulta maggiore nelle persone 50-69enni e in quelle con bassa istruzione e difficoltà economiche.

Salute percepita (%)
PASSI 2008-12




La presenza di sintomi di depressione è più frequente nelle persone con patologia cronica respiratoria, soprattutto nelle donne e nelle persone con basso livello socio-economico

Tra le persone di 18-69 anni con patologia cronica respiratoria il 14% ha riferito sintomi di depressione; questa percentuale risulta significativamente maggiore rispetto a chi non ha malattie respiratorie (7%), in ogni classe d'età.

La prevalenza di persone con patologia cronica con sintomi di depressione è maggiore tra:

- i 35-69enni (15%)
- le donne (16%)
- le persone con bassa istruzione (18%)
- le persone con difficoltà economiche (18%).


Sintomi di depressione (%)
Emilia-Romagna, PASSI 2008-12



Le persone con patologia respiratoria cronica sono più spesso sedentarie e in eccesso ponderale

Presenza di fattori di rischio (%)


Emilia-Romagna, PASSI 2008-12



Nelle persone svantaggiate sono più frequenti fumo, eccesso ponderale e sedentarietà

Presenza di fattori di rischio nelle persone con patologia cronica respiratoria per livello socio-economico* (%)


Emilia-Romagna, PASSI 2008-12



La sedentarietà è significativamente meno diffusa in Emilia-Romagna rispetto alla media nazionale

Presenza di fattori di rischio nelle persone con patologia cronica respiratoria (%)


PASSI 2008-12



L'attenzione dei sanitari agli stili di vita è migliorabile

Consigli degli operatori sanitari alle persone con patologia cronica respiratoria (%)

Emilia-Romagna, PASSI 2008-12



* Livello basso = bassa istruzione e difficoltà economiche
 Livello medio = bassa istruzione e assenza di difficoltà economiche oppure alta istruzione e difficoltà economiche
 Livello alto = alta istruzione e assenza di difficoltà economiche

A cura del Gruppo Tecnico PASSI Emilia-Romagna :

Nicoletta Bertozzi, Giuliano Carrozzi, Letizia Sampaolo, Lara Bolognesi, Lara Sardonini, Federica Balestra, Anna Rita Sacchi, Alma Nieddu, Anna Maria Ferrari, Natalina Collina, Sara De Lisi, Ivana Stefanelli, Aldo De Togni, Giuliano Silvi, Cristina Raineri, Oscar Mingozzi, Patrizia Vitali, Michela Morri, Rossana Mignani, Paola Angelini, Alba Carola Finarelli

Per maggiori informazioni consulta il report www.ausl.mo.it/dsp/disuguaglianzeconomiche