

脑膜炎 LA MENINGITE

脑膜炎是一种严重损害脑膜的传染性疾病，一些缠绕着大脑的薄膜。

脑膜炎可由不同的病毒和不同的病菌引起，而在他们之中最重要和最常见的是 *Nerisseria* 氏脑膜炎球菌，又称为脑膜炎球菌。

脑膜炎球菌脑膜炎

脑膜炎球菌脑膜炎是由人类通过鼻咽的分泌液传染给人类的。一位脑膜炎患者或带菌者，可由他们的咳嗽、打嗝、说话和唱歌时传播。

脑膜炎存在于全世界，但有些地区有较高的危险性，例如在拉丁美洲和非洲。在后者中证实受到流行病蹂躏的是近撒哈拉地区，脑膜炎出名的地带，它从西部塞内加尔经过马里、布基纳法索、加纳、多哥、贝宁、尼日尔、尼日利亚、喀麦隆、乍得和中非共和国到东部苏丹。

如何显示病征

在受到感染后的 2-10 日内，会突然得发高烧，并伴有严重的头痛、恶心、颈部运转困难，不安和相对的麻木直到失去知觉。

应及时在最短的时间内接受治疗，由于缺乏一种迅速和有效的治疗方式，脑膜炎可造成严重的后果，甚至于死亡。

如何预防脑膜炎

特别是在脑膜炎地带其中的国家逗留时，有患脑膜炎球菌脑膜炎的危险性，如有可能，避免生活在拥挤的环境和接种疫苗，以减低危险性。在非常明确的情况下，可使用的疫苗有两种，应按接受接种者的年龄而定，尤其病例的起因是哪一种脑膜炎：脑膜炎实际上存在着 14 种的病菌。两种疫苗的其中之一能对四种脑膜炎起防护作用：A, C, Y 和 W135，是大部分流行病和其他 C 型脑膜炎的起因。

对于向麦加朝拜者，注射疫苗是必需履行的。

此外应记住，如果与患脑膜炎球菌脑膜炎者一起接触、生活，包括已接种过疫苗者，医生将建议服用几日的抗生素。在这种情况下，是可能患病的适当时机。

如你打算到你自己的国家去旅游，请在至少出发前一个月向你住处附近的卫生部门请教。你将得到进一步的咨询和接种疫苗的益处说明。

2003 年六月修正。Aggiornato al Giugno 2003.

Cooperativa INTEGRA 翻译.Tradotto da Cooperativa INTEGRA

由莫德纳省赞助.Con il contributo della Provincia di Modena.

欲知更多的信息，请洽: Per saperne di più, rivolgiti a :