

SIFILIS - SIFILIDE

La sífilis es una enfermedad contagiosa causada por una bacteria llamada espiroqueta o *Treponema pallidum*. La sífilis es una enfermedad muy seria que se difunde por todo el cuerpo y que si no se trata puede provocar insuficiencia cardíaca, demencia, ceguera, parálisis y muerte. La sífilis es una enfermedad que se contrae teniendo relaciones sexuales con una persona infectada (sífilis primaria), pero existe también la sífilis congénita que es la que transmite una madre infectada a su feto.

La sífilis congénita puede causar la muerte del feto en un 40% de los casos o puede provocar ceguera u otros daños a los órganos internos del recién nacido.

La infección de sífilis puede aumentar el riesgo de infección por VIH, el virus que causa el SIDA.

MANIFESTACIONES DE LA ENFERMEDAD

Al inicio, el primer síntoma consiste normalmente en una lesión abierta e indolora, llamada chancro, localizada en la zona de contacto sexual (pene, vagina, ano, recto o boca). Las glándulas se hinchan también cerca del chancro. La lesión suele aparecer de 2 hasta 6 semanas después de una infección y desaparece a las pocas semanas.

La fase sucesiva está caracterizada por fiebre, erupciones cutáneas generalizadas y glándulas hinchadas por todo el cuerpo (sífilis secundaria). Estos síntomas remiten después de 20 a 70 días sin dejar ninguna señal. Sin embargo, si no se trata la sífilis, después de algunos meses aparece la sífilis del tercer nivel o tardía. En esta fase, son atacados la piel, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso en particular, pero todos los órganos y aparatos internos pueden sufrir daños irreparables.

COMO SABER SI HAS ESTADO INFECTADO DE SIFILIS

Se pueden hacer unas pruebas de sangre que determinan si uno tiene sífilis incluso ante la ausencia de síntomas. Es un examen corriente que se efectúa sobre las mujeres embarazadas durante los tres primeros meses de embarazo.

Se pueden hacer también unas pruebas al microscopio de los líquidos de un chancro abierto para determinar si uno tiene sífilis.

QUE HACER PARA PREVENIR LA SÍFILIS

- Limita el número de tus parejas y utiliza el condón, sobre todo si tus relaciones son ocasionales.
- En caso de infección, evita todo contacto sexual hasta que no estés totalmente curado, y procura que tu/tus parejas sean tratadas también para evitar nuevamente el contagio.
- Si estás embarazada, dirígete a tu ginecólogo para hacer los análisis de sangre necesarios: recuerda que la prevención y el diagnóstico de la sífilis congénita dependen de la rapidez con la que se determine la presencia de la sífilis en la futura mamá. Si durante el embarazo mantienes relaciones sexuales no

- protegidas, no dudes en volver a hacerte los exámenes pertinentes, y acuérdate de usar los condones.

Última actualización Junio 2003 - Aggiornato al Giugno 2003

Traducido por la Cooperativa INTEGRA - Tradotto da Cooperativa INTEGRA

Patrocinado por Provincia de Módena - Con il contributo della Provincia di Modena.

Para mayor información no duden en contactar a:

Per saperne di più rivolgersi a: