

MENINGHITIS - MENINGITE

Ang meninghitis ay isang sakit na nakakahawa, na ang tinatamaan ay ang meninghis(manipis na membran bumabalot sa utak). ang *meninghitis* ay maring sanhi ng birus o bakterya at isa sa mga ito ay ang importante na "Naisseria meningitidis" na tinatawag rin na meningococco.

Meningite Meningococcica

Ang *meninghitis menincogococcica* ay naitratrasmit sa pamamagitan ng sekresiyon ng nasofaringe. Ang taong maysakit o tagadala ay maaring maitrasmit ang mikrobyo sa pamamagitan ng pag-ubo, pa-bahin, pag samantalang kumakanta o nagsasalita.

Ang pangnib ng pagkakasakit ay mataas sa kabataan at bumaba pag nagkaedad.

Ang sakit ay presente sa buong mondo, ngunit higit ang panganib sa mga arya ng Amerika Latina at sa Africa. Itong huling(binanggit na) kontinente ang rehiyon na siyang tinupok ng epidemiya at ang pook ng Subsahariana ay kinikilala na sintron ng *meninghitis*, simula ng Senegal, sa kaunlaran ng Sudan at sa silangan papuntang Mali, ang Burkina Fasi, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigerya, Camerun, Ciad at ang Repubblika ng Sentro Africa.

Paano nag-uumpisa ang sakit

Pagkatapos ng 2-10 araw ng paghawa nagsisimula kaagad ang mataas ng lagnat na may kasamang sakit sa uo matinding sakit, pagsussuka, mahirap na igalaw ang leeg, na kung minsan ay mawalan ng malay.

Mahalagang umpisahan kaagad ang paggagamot na kun mapapabayaang ay maaring maging resulta ng kamatayan.

Paano ang gagawin para maagapan ang meninghitis meningococcica

Ang panganib ng pagkakasakit ng meninghitis ay namumukod sa panunuluyan sa isa sa mga bansang sinturon ng meninghits, maaring maiwasan sa pag-iwas sa lugar na siksikan, at sa pagbabakuna. Dalawang uri ng bakuna ang nakahanda depende sa edad ng taong dapat bakunahan at higit sa lahat sa tpo ng meningococcica may kapanagutan sa sakit. Mayronoong 14 na klase o uri ng bakterya. Itong dalawnag uri ng bakuna ay maaring maprotektuhan ang apat na uri ng bakterya(A,C,Yat W135 na nanagot sa mahalagang parte ng epidemiya hambang sa tipo C).

Ang pagbabakuna ay obligatoryo para sa mga maglalakbay papunta ng Mekka. Kinakailangan alalahanin na kung may kasambahay na may meninghitis ang doktor ay magrerekomenda na uminom ng antibiyotiko ng mga ilang araw kahit na nabakunahan na. Sa ganitong sitwasyon ay darami ang posibilidad ng talagang pagkakasakit.

Kung ikaw ay may balak na programang maglakbay sa mga bansang pinangggalingan mangyaring sumangguni sa nalalapit na Servizio di Igiene Pubblica kung isang buwan bago umalis. Tatanggap ng impormasyon at indikasyon sa kahalagahan ng pagpapabakuna.

Aggiornato al Giugno 2003
Tradotto da Cooperativa INTEGRA
Con il contributo della Provincia di Modena
Per saperne di più rivolgersi a: