

# AIDS

Ang "aids" ay isang sakit na nakakahawa - galing sa birus na HIV o birus "immune human defecency" na nakukuha sa pamamagitan ng pagtatalik o sa dugo ng taong may sakit o (ito ay) siero positivo, Gaya ng epatite B, ang birus ay tumatagos at pumapasok sa sugat o kahit sa balat at sa pamamagitan ng uhog ng bunganga ng henital. Ang <pangamit> ng paghawa ng aids ay higit na mababa <hambang> sa birus ng etatite B; ngunit ang sakti ay mas brave, sa normal na konklusyon (ay) kamatayan ang <hantong> ng taong maysakit ng aids. Wala pang bakuna para magamot o <malunasan> ang sakit. Ang AIDS ay naging pagnuunahing sakit simula ng taong 1980, na hanggang ngayon ay tumataas ang bilang ng maysakit sa buong mundo(daigdig) ng taong 2002, mahigit na 28 milyon sa sona ng Africa Subsahariana. Sa lugar na ita ang birus ay dumadaan higit sa lahat sa pamamagitan ng pagtatalik. Ang resulta ay maysakit o siyeropositivo at ang <kahihitnatnan> ang matas na bilang ng mga batang nahawa pagkasilang. Ang sitwasyon ay higit na <pinupuna> ang pagkalat sa mga..... ang natatanging sakit na nakakahawa gaya ng tuberkolosis, nangunguna and AIDS. Mataas ang mga bilang ng mga ulila sa sakit.

## Paano nagsisimula ang sakit

Ang birus HIV ay (tinutulogsa ang selula) ng inmunitarya itinakda ng impeksiyon. Sa umpisa hindi sa lugar, sa uri ang pangunahing sintomas ng impeksiyon ay ang pagkakaroon sa loob ng <laban> sa katawan ng dugo na may HIV o siyeropositivo; sa mga ibang kaso, ang impeksiyon ng HIV ay maaring tiyakin ang sakit(malala) na nagtatagal ng 1-2 linggo pagkatapos na lumabas ng mga ilang buwan pagkaraan ng paghawa.

Ang sintomas ay nagpapakita ng lagnat at pamamaga ng glandula'ng limpatika ng leeg at bumabalik kahit hindi (ginagamot).

Ang inmunidad ng HIV ay lumalala na gradwal na paraan, kung minsan pagkaran ng mahabang panahon(buwan/taon)o kaya ay sa sakit na mataas ang pagdami ng birus sa impeksiyon na kung minsan ay bumabagsak na tumor.

## Ano ang gagawin para mabawasan ang pakalat ng AIDS

Ang pagsugpo ng AIDS ay kinakailangan ang waston <pamamaraan>. Sa bawat kaso kinakailangan iwasn ang palit-palit ng partners lahok-lahok na sekswal ang paminsan-minsan na pagtatalik ng walang kondom, at ang paggamit ng heringgilya.

Kung ikaw ay siyeropositivo

- ipaalam sa iyong partner at gumamit ng kondom sa pagtatalik: alalahanin na ang panggamit ay mas mataas ang paghawa sa lalake kaysa babae;
- gumamit ng pansarili sa personal na sepilyo, gunting para sa kuko, pang balbas o kahit na anumang bagay na ginagamit sa pagmamaniyur;
- kung gumagamit ng droga o gamot huwag iwawanan ang mga ginagamit na

heringgilya kung saan-saan na maaring makabigay panggamit sa iba;

- kung ikaw ay nagdadalang tao ipaalam sa iyong hinekologo upang mabigyan ngproteksiyon ang sanggol na nasa iyong sinapupunan;
- komunsulta sa isang espisyalista para alamin ang upang makapagbigay ng terapiyang nararapat;

Aggiornato al Giugno 2003

Tradotto da Cooperativa INTEGRA

Con il contributo della Provincia di Modena

Per saperne di più rivolgersi a: