

LA SYPHILIS/LA SIFILIDE

La syphilis est une maladie contagieuse causée par la bactérie nommée *treponema pallidum*. La syphilis est une infection très grave qui se propage dans tout le corps. En l'absence d'un traitement approprié, la maladie provoque la cardiopathie, la démence, la cécité, la paralysie et la mort. La syphilis est transmise par contact sexuel (vaginal, anal ou buccogénital) avec une personne infectée, mais peut aussi être transmise au fœtus par la mère (syphilis congénitale).

La syphilis congénitale peut dans 40% des cas causer la mort du fœtus ou lors de la naissance l'enfant peut être atteint de cécité et certains de ses organes peuvent être gravement atteints.

La syphilis accroît le risque de transmettre ou de contracter l'infection à HIV (virus responsable du sida).

QUELS SONT LES SYMPTOMES DE LA MALADIE?

Le premier symptôme de la syphilis est généralement un ulcère, petite plaie indolore (sifiloma) dans la région du contact sexuel (pénis, vagin, anus, rectum ou bouche), accompagné d'un gonflement des ganglions lymphatiques. La plaie apparaît habituellement environ 2 à 6 semaines après qu'on s'est exposé à l'infection et elle disparaît en l'espace de quelques semaines.

Peu après, on constate une éruption sur tout le corps (stade secondaire de la maladie), des ganglions lymphatiques enflés, la fièvre. Ces symptômes disparaissent également en l'espace de quelques semaines (20 à 70 jours) sans laisser aucune trace. Si la syphilis n'est pas traitée, il apparaît après quelques mois ou années la syphilis terziaria. A cette phase de la maladie, la peau, le système cardiovasculaire et le système nerveux seront touchés et parfois aussi tous les organes du corps.

COMMENT DIAGNOSTIQUE-T-ON LA SYPHILIS ?

Il existe plusieurs façons de diagnostiquer la syphilis. Il est possible d'effectuer un test sérologique (analyse de sang) qui permet de diagnostiquer l'infection en l'absence de symptômes. Cette examen est effectué automatiquement sur toutes les femmes durant le premier trimestre de grossesse.

En outre, l'examen au microscope d'un échantillon de la plaie permet de diagnostiquer la maladie.

QUELS SONT LES MOYENS DE PREVENTION ?

Les mesures de préventions contre cette maladie reposent sur l'adoption de comportements responsables:

- limiter le nombre de partenaires sexuels et utiliser des préservatifs lors de rapports sexuels d'autant plus si ceux-ci sont occasionnels,

- en cas d'infection, éviter les rapports sexuels jusqu'à une complète guérison. **Il est aussi important de veiller à ce que votre (vos) partenaire(s) sexuel(s) se fasse(nt) également soigner pour prévenir une réinfection,**
- si vous êtes enceinte, adressez-vous à votre gynécologue afin d'effectuer le test sérologique: la prévention et le dépistage de la syphilis congénitale chez la future maman dépend de la rapidité avec laquelle le diagnostic va être effectué. Si durant votre grossesse vous avez des rapports sexuels sans utilisation de protection, n'hésitez pas à refaire un test, et pensez à utiliser des préservatifs.

Ajourné en juin 2003/Aggiornato al Giugno 2003

Traduction Cooperative INTEGRA/Tradotto da Cooperativa INTEGRA

Avec la contribution de la Province de Modène/Con il contributo della Provincia di Modena.

Si vous souhaitez effectuer un test de dépistage ou si vous êtes enceinte, adressez-vous à.....

Per saperne di più rivolgersi a: