

KIŁA - SIFILIDE

Kiła jest chorobą zakaźną, weneryczną powodowaną przez bakterię zwaną *Treponema pallidum* (krętek błądy). Kiła to bardzo poważna infekcja, która się rozprzestrzenia na całym ciele i, o ile nie będzie leczona, może spowodować kardiopatię, chorobę umysłową, ślepotę, paraliż i śmierć. Kiła przenosi się bezpośrednio w czasie stosunku płciowego (również stosunki ekstragenitalne) z osobami zakażonymi (kiła nabyta), ale również może być przekazana z matki na płód (kiła wrodzona).

Kiła wrodzona może spowodować śmierć płodu w 40% przypadków lub narodziny dzieci chorych cierpiących na ślepotę i inne poważne uszkodzenia organów.

Zakażenie kiłą zwiększa ryzyko infekcji HIV-em, wirusem, który powoduje AIDS.

JAK SIĘ MANIFESTUJE CHOROBA

Pierwszym objawem kiły jest zazwyczaj wrzód, mały, niebolesny (kilaki) w strefie kontaktu seksualnego (penis, pochwa, odbyt, odbytnica, usta) w połączeniu z powiększeniem okolicznych węzłów chłonnych. Wrzód zazwyczaj pojawia się po 2-6 tygodniach od zakażenia i ginie w ciągu kilku tygodni.

Następna faza objawia się gorączką, wysypką na całym ciele i powiększeniem węzłów chłonnych na całym ciele (wtórna faza). Również i te objawy znikną samoczynnie po 20-70 dniach bez pozostawienia jakiegokolwiek znaku.

Jeżeli nie leczona, po kilku miesiącach lub nawet po kilku latach pojawi się kiła trzeciej fazy. W tej fazie zaatakowane są skóra, układ sercowo-naczyniowy i nerwowy, ale również inne narządy i układy mogą być zaatakowane.

CO ROBIĆ ŻEBY SPRAWDZIĆ CZY ZOSTAŁEŚ ZAKAŻONY

Jest możliwe wykonanie testu serologicznego (przez pobranie krwi), który może wykryć infekcję nawet bez objawów.

To badanie wykonuje się rutynowo wszystkim kobietom w ciąży w przeciągu pierwszych trzech miesięcy.

Kiła może być również zdiagnozowana poprzez badanie wycinka wrzodu pod mikroskopem.

CO ROBIĆ ŻEBY ZAPOBIEC CHOROBI

- zapobieganie kile bazuje się na właściwym postępowaniu: ograniczona ilość partnerów seksualnych i używanie prezerwatywy, zwłaszcza w stosunkach przypadkowych
- w przypadku stwierdzonej infekcji, unikać stosunków płciowych aż do momentu całkowitego wyleczenia i upewnić się, że również twój (twoi) partner poddał się terapii w celu uniknięcia ponownego zakażenia

- jeżeli jesteś w ciąży zwróć się do ginekologa w celu zrobienia rutynowego testu na surowicę krwi ; zapobieganie i diagnostyka kiły wrodzonej u przyszłych mam zależą od natychmiastowej diagnozy. Jeżeli w czasie trwania ciąży masz niebezpieczne stosunki z nowymi partnerami, nie wahaj się przed powtórzeniem badania i pamiętaj o używaniu prezerwatywy.

Uaktualniono w czerwcu 2003/Aggiornato al giugno 2003

Przetłumaczone przez Spółdzielnię Integra/Tradotto da Cooperativa Integra

Z udziałem Urzędu Wojewódzkiego w Modenie /Con il contributo della Provincia di Modena

Po dodatkowe informacje zwrócić się do:

Per saperne di più, rivolgersi a: