

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH - LA MENINGITE

Zapalenie opon mózgowych jest chorobą zakaźną , która atakuje delikatne błony osłaniające mózg.

Zapalenie opon mózgowych może być wywołane przez różne wirusy lub bakterie, wśród których najważniejszy to ziarenkowiec *Neisseria meningitidis*, zwany również meningokok .

ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH WYWOŁANE PRZEZ MENINGOKOK

Zapalenie opon mózgowych wywołane przez meningokok jest przekazywane z osoby na osobę poprzez wydzieliny z nosa i krtani. Osoba chora lub nosiciel mogą przekazać bakterie poprzez ataki kaszlu , kichnięcia , kiedy mówią lub śpiewają.

Ryzyko zachorowania jest większe u dzieci i zmniejsza się wraz z wiekiem.

Choroba ta jest obecna na całym świecie, niemniej są strefy gdzie ryzyko jest większe, jak na przykład w Ameryce Południowej i w Afryce. Na tym ostatnim kontynencie , region, gdzie weryfikują się dewastujące epidemie to obszar na południe od Sahary, znany również jako pas zapalenia opon mózgowych , który ciągnie się od Senegalu na zachodzie do Sudanu na wschodzie i przechodzi przez Mali , Burkina Faso , Ghana , Togo , Benin , Niger , Nigeria , Kamerun , Czad i Republikę Środkowej Afryki.

JAK SIĘ MANIFESTUJE CHOROBA

Po 2-10 dniach od momentu zakażenia pojawiają się nieoczekiwanie wysoka gorączka, szczególnie silny ból głowy , wymioty , trudności z ruszaniem szyją, podniecenie lub, przeciwnie, otępienie aż do utraty świadomości.

Konieczne jest zaczęcie w jak najszybszym czasie kuracji , dlatego że brak szybkiej i skutecznej interwencji może spowodować poważne konsekwencje , a nawet śmierć.

CO ROBIĆ ŻEBY ZAPOBIEC ZAPALENIU OPON MÓZGOWYCH WYWOŁANYM

PRZEZ MENINGOKOK

Ryzyko zachorowania na zapalenie opon mózgowych wywołane przez meningokok, szczególnie w czasie pobytu w jednym z państw pasa zapalenia opon mózgowych , może być zmniejszone unikając, o ile to możliwe, przebywania w warunkach nagromadzenia ludności i za pomocą szczepienia.

W szczegółowo określonych sytuacjach istnieją 2 rodzaje szczepionek, zależnie od wieku osoby poddawanej szczepieniu i , przede wszystkim , od typu meningokoka odpowiedzialnego za wywołanie choroby : istnieje 14 typów tych drobnoustroji .

Jedna z dwóch szczepionek jest w stanie zabezpieczyć przed 4 typami meningokoka: A, C, Y i W135, odpowiedzialni, w większości wypadków, za epidemie, a druga szczepionka zabezpiecza tylko przed typem C.

Szczepienie jest obowiązkowe dla pielgrzymów idących do La Mecca.

Trzeba ponadto przypomnieć, że jeżeli żyje się w kontakcie z osobą chorą na zapalenie opon mózgowych wywołane przez meningokoka, lekarz poleca przyjęcie antybiotyku przez kilka dni, nawet jeżeli się było szczepionym. W takiej bowiem sytuacji znacznie wzrasta możliwość zarażenia się i zachorowania.

Jeżeli planujesz podróż do rodzinnego kraju zwróć się do najbliższej Placówki Higieny Publicznej przynajmniej miesiąc przed podróżą. Otrzymasz dodatkowe informacje i wskazówki czy warto się zaszczepić.

Uaktualniono w czerwcu 2003/Aggiornato al giugno 2003

Przetłumaczone przez Spółdzielnię Integra/Tradotto da Cooperativa Integra

Z udziałem Urzędu Wojewódzkiego w Modenie /Con il contributo della Provincia di Modena

Po dodatkowe informacje zwrócić się do:

Per saperne di più, rivolgersi a: