

PARAZITOZA (PADUCHII) – PEDICULOSI

Ce reprezinta :

Parazitoza este cauzata de un mic parazit (lung 2-3 mm), paduchele de par, care traieste in mod exclusiv pe cap hranindu-se cu sange.

Cullare lui, alb murdar sau gri, poate devesi mai deschisa sau mai inchisa in functie de culoarea parului celui care il “ gazduieste “ , in asa maniera de a se ascunde.

Femela depoziteaza de la 100 la 300 de oua (lendini) , cu un ritm de 8-10 pe zi, acestia fixindu-se pe par prin intermediul unei substante lipicioase. Din acestea , in 6-10 zile naste o larva care devine un parazit adult in circa 10 zile.

Paduchele traieste doar 1 sau 2 zile in afara parului deoarece are nevoase de caldura si hrana pentru a supravietui.

Parazitoza e raspindita in toate tarile lumii , nu reprezinta semn de proasta igiena si poate fi intilnita la persoane de orice statut social. Intereseaza in mod particular copii si adolescentii da si adultii pot fi in cauza.

MOD DE MANIFESTARE :

In mod normal se descopera existenta paduchilor datorita mincarimii, de obicei foarte insistenta, pina la a provoca zgirieturi si cojite. In anumite cazuri maincarimea nu esista iar paducii vin descoperiti in mod casual, pieptanindu-se sau prin spalarea capului. P ot fi prezente doar ouale care apar minuscole (circa 1 mm) albe sau gri lipite foarte bine de par devenind dificila inlaturarea lor, in mod diferit de matreata care cade singura.Si in acest caz persoana in cauza poate nu avea mincarime.

Zonale capului in care se pot intilni in mod frecvent caduchi si lindinii sint ceafa, timplele si in spatele urechilor: pentru a-i vedea e necesar a ridica usor parul in mod contrar cresterii.

MODALITATI DE TRANSMITERE :

Contagiarea este extrem de usoara cel mai frecvent prin intermediul simplului contact al capului cu parul altei persoane sau mai dificil prin intermediul pieptinilor, periilor, lenjeriei de pat, ecc.

Din acest motiv raspindirea infamilie e ca si o regula, si in scoala, fapt intilnit foarte frecvent.

MODALITATI DE PREVENIRE :

Nu esista precautii care pot preveni.

Enecesar in schimb asi da seama in timp util de presenta paduchilor pentru a-i putea insatura repede, deci e foarte important ca parintii sa controleze copii.

Spalarea frecventa a capului si controlul parului la copii (de doua ori pe saptamina) , in afara faptului ca e o buna norma igienica personala, ajuta a scoate in evidenta in cel mai rapid mod infectarea cu astfel de paratiti. Nu e utila taierea parului.

Samponurile si diversele produse antipaduchi nu servesc a insatura pericolul de contagiare si nu vin folosite in mod preventiv.

MOD DE ELIMINARE :

In cazul in care descoperiti paduchii sau ouale lor trebie sa utilizati unul din diversele produse care se gasesc in farmacie (polvere, gel, sampon), care actioneaza omorind acest parazit. Actiunea fat ade oua nu e mereu efficace.

Asa cum e indicat pe produsul utilizat, este necesararepetarea teratamentului la distanta de citava zile /(macar pentru 7-10) pentru a ucide larvele care ar fi putut ramine vii inauuntrul oualor .

Dupa tratament se va putea uza un pieptene foarte des pentru a usur aindepartarea larvelor si a oualor.

Se sugereaza indepartarea oualor taind parul de care ele sunt prinse.

In cazul in care se inregistreaza un caz de parazitoza in familie e necesar efecuirea unui control la toti membrii familiei.

Aggiornato al Giugno 2003

Tradotto da Cooperativa INTEGRA

Con il contributo della Provincia di Modena.

Pentru a avea mai multe informatii adreseazate la :

Per saperne di più rivolgersi a :