

SIFILISUL - SIFILIDE

Sifilisul este o boala contagioasa cauzata de o bacterie denumita *Treponema pallidum*. Sifilisul e o infectie foarte grava care se transmite in tot corpul iar in cazul in care nu vine tratata poate cauza cardiopatie, dementa, orbire, paralizie pina la a cauza moartea. Sifilisul se ia prin contact direct sexual (sex vaginal, anal , oral) cu indivizi infectati (Sifilis preluat) , dar poate fi transmis si de la mama la fat. (Sifilis congenital) .

Sifilisul congenital poate cauza moartea fatului in 40% din cazuri sau poate duce la nasterea unor copii infectati afectati de orbire, si alte daune grave la alte organe.

Infectarea cu sifilis poate creste riscul de infectare cu virusul HIV, virus care cauzeaza sida.

MODALITATI DE MANIFESTARE A BOLII

Primul simptom al bolii este de obicei o buba, o mjica exema (sifiloma) in zona de contact sexual (vagin, anus, rect, gura) , insotita de unflatari de jur imprejur. Leziunea apare de obicei 2-6 saptamini dupa ce a survenit contagiarea si dispare in citeva saptamini.

Faza succesiva este caracterizata prin febra, eruptie generalizata la nivelul pielii si unflarea glandelor limfatice in tot corpul (stadiul secundar) . Si aceste leziuni dispar in mod spontan in 20-70 zile fara a lasa nici un semn. In cazul in care nu se aplica nici un tratament, dupa citeva luni sau ani, apare sifilisul tertiar. In aceasta faza sunt afectate pielea, sistemul cardiovascular, sistemul nervos, dar toate organele si aparatele pot fi cuprinse.

MODALITATI DE A VEDEA DACA AI FOST INFECTAT DE ACEST VIRUS

Este posibil a face un test de sange care poate confirma daca esti sanatos sau bolnav, chiar si in cazul in care nu se inregistreaza nici o simptome. Acest test vine efectuat in mod obisnuit asupra tuturor femeilor gravide, in primul trimestru de sarcina.

Sifilisul poate fi diagnosticat si prin examenul la microscop a unui campion de leziune.

MODALITATI DE PREVENIRE A BOLII

- prevenirea bolii se bazeaza in adoptarea unui comportament corect : limitarea numarului de parteneri sexuali si utilizarea prezervativului, in mod special in cazul in care nu exista un singur si stabil partener sexual,

- in cazul in care a survenit infectarea , evitarea raporturilor sexuale pina la completa vindecare si asigurarea ca partenerul tau trebuie primi acelasi tratament pentru a evita de a fi infectat din nou,
- daca esti insarcinata prezintate la medicul tau ginecolog pentru a efectua testul de singe: prevenirea si diagnosticarea sifilisului congenital depinde de cit de curind te prezinti a face testul. In cazul in care in timpul sarcini ai raporturi sexuale cu partener noi, in mod neprotejat , nu ezita a repeta tesul de singe, si aminteste-ti sa uzezi prezervativul.

Aggiornato al Giugno 2003

Tradotto da Cooperativa INTEGRA

Con il contributo della Provincia di Modena.

Pentru a avea mai multe informatii adreseazate la :

Per saperne di più, rivolgiti a :