

HEPATITA B - EPATITE B

Hepatita B este o boala contagioasa care afecteaza ficatul; este cauzata de un microorganism denumit virusul hepatitei B care vine transmis prin intermediul singelui si a raporturilor sexuale.

Virusul e prezent in sange si in alte lichide biologice, in mod particular in sperma si secretii vaginale, ale persoanelor infectate sau purtatoare. Ultimii sunt persoane care chiar daca nu sunt bolnave ospiteaza agentul infectiv si au capacitatea de a transmite si la o alta persoana acest virus. Sunt mult mai periculosi decat bolnavii propriu-zisi datorita faptului ca foarte des ignora conditia in care se afla deci nu sunt in grad de a actiona in masura in care sa evite contagiarea altor persoane.

Numarul de purtatori al acestui virus in tarile Africii, Asiei, in Medium Orient, in Europa de est si in centru si sud America este extrem de ridicat, depasind in anumite localitati 10% din populatia totala.

In multe din aceste locuri marea majoritate de cazuri de infectare se inregistreaza la copii, in cazul carora este mult mai simplu sa se cronocizeze boala in comparatie cu adultii. O situatie grava in mod particular este reprezentata in mod particular de transmiterea bolii de la mama la copil in timpul sarcinii si in mod deosebit in timpul nasterii.

MODALITATI DE MANIFESTARE A BOLII

Dupa o perioada de timp variabila intre 2 si 6 luni incepind din momentul in care a intervenit contagiarea apar simptomele tipice bolii : oboseala si pierderea potei de mincare, colorarea in culoarea galena a mucoasei, cullarea inchisa a urinei, febra.

Acesta este tabloul tipic de manifestare a bolii (care nu se diferentiaza cu nimic de altetipuri de hepatita acuta) dar aceasta se poate presenta in diverse moduri de la forma rapida, fara simptome evidente pina la aceea in care ficatul e afectat in mod grav.

Hepatita B in majoritatea cazurilor este vindecabila dar in anumite cazuri se poate agrava, transformindu-se in : hepatita cronica, ciroza, cancer la ficat. Agravarea acestei boli intervine in medie de 5-10% din cazuri, cu anumite diferente considerabile in functie de virsta bolnavului (90% la bebelusi, 20-50% la copii pina in cinci ani, 1-10% la cei mai mari de cinci ani).

MODALITATI DE PREVENIRE A BOLII

Modalitatile de prevenire a bolii se bazeaza in mod principal in adoptarea de comportamente adecvate in asemenea cazuri si prin vaccinare.

I toate cazurile se vor evita contactele sexuale (avind mai multi parteneri sexuali in acelasi timp), raporturile sexuale vocazionale fara a face uz de prezervativ, si folosirea in comun a seringilor.

In cazul in care esti la cunostinta de a fi purtator de virus :

- trebbie sa informezi partenerul tau de aceasta conditie de sanatate in care te gasesti si totodata persoanele cu care traiesti (familia) si trebbie sa-i informezi de existenta unui vaccin eficace care il pot avea in mod gratuit,
- trebbie utilizate in mod exclusiv si personal periuta de dinti, forfecutele de unghii, aparatul de ras, si orice alt instrument de manechiura.
- In cazul in care uzezi de seringhe pentru cure medicale sau droguri nu le lasa abandonate duoa ce le-ai folosit, distrugele in maniera in care nu mai pot fi folosite si de alte persoane,
- In cazul in care esti gravida trebbie sa informezi medicul ginecolog in maniera in care acesta poate lua masurile de precautie , dovedite a fi foarte eficace in a proteza copilul.

In cazul in care consideri necesare ulterioare informatii privitoare la hepatita B sau vrei sa te vaccinezi te poti adresa la Serviciul de Igiena Publica cel mai apropiat.

In cazul in care esti interesat a face analize pentru a vedea daca esti bolnav adreseazate medicului de familie.

Aggiornato al Giugno 2003

Tradotto da Cooperativa INTEGRA

Con il contributo della Provincia di Modena.

Pentru a avea mai multe informatii adreseazate la :

Per saperne di più rivolgersi a :