

## **RIIA - SCABBIA**

Riia e o boala parazitara cauzata de un o specie de un mic paianjen, a carui femela grvida sapa mici galerii sub piele si depone ouale. Din aceste oua nasc alte insecte de acest tip care in 8-16 zile devin adulti, ajung persuada in care se reproduc si astfel apar noi mici galerii sub piele.

Acest proces continuapana cind nu se intervine cu un tratament specific ( riia nu se vindeca singura, fara tratament ).

Riia e o boala intilnita doar la specie umana.

Este contagiosa doar la contact direct, piele pe piele, intre o persoana care are deja riie si o alta persoana sanatoasa, cind spre exemplu se dorme in acelaș pat, sau la adulti in timpul paportului sexual.

Se poate transmite, mai rar, si in mod in direct, prin intermediul asternutului, a hainelor sau a prosoapelor folosite de o persoana infectata si apoi reutilizate de o alta persoana sanatoasa; parazitul nu poate supravietui mult timp diparte de corpus uman.

Persoana infectata , in urma tratamentului specific este considerata vindecata, deci necontagioasa.

Riia se intilneste ca boala in toata lumea. De citava ani cazurile de riie au devenit mai frecvente, au crescut implicind persoane de toate nivelele sociale si economice, fara a face distinctie de virsta, rasa sau conditii de igiena personala.

### **CUM SE MANIFESTA BOALA**

Riia da senzatii de mincarime, care se intensifica in timpul noptii si pe piele apar mici bubite. Cum am explicat mai sus este vorba de mici galerii sapate de acest parazit, lungi de citava millimetri, care au culoare agri sau alba, care se termina cu o mica unflatara tip basica, in care se gaseste femela adulta.

Sunt frecvente leziunile cutanee sau zgirieturile provocate prin scarpinare, care la rindul lor se pot infecta.

Leziunile descrise se intilnesc mai frecvent localizate intre degetele de la miini, la incheieturi, la coate, la subbrat, in jurul taliei, pe coapse, in jurul buricului la copii, la organele genitale la barbat, sub barbie si in jurul aureolelor mamale la femeie.

La bebelus se poate intilni localizata in regiunea capului , a gitului, a palmelor si a talpilor.

Mincarimea poate continua citava saptamini chiar si dupa ce boala a fost tratata

La persoanele care au un sistem imunitar redus leziunile pielii sunt de obicei mult mai raspindite si mai grave, pe cind mincarimea poate chiar sa nu existe.

## **METODE DE PREVENIRE A BOLII**

Cind apar leziuni ale pielii insolite de o intensa mancarime este foarte important ca persoana in cauza sa se prezinte la medic fara a mai pierde timpul , efectuind controlul necesar.

Daca diagnosticul este de rii este necesar a efectua in modul cit mai precis tratamentul, si a efectua toate masurile de caracer igienic recomandate, care constau in mod particular in spalarea rufelor la temperatura de cel putin 60° C, a lenjeriei de pat ,a prosoapelor folosite de bolnav.

Riia nu e o boala grava, dar prezinta un grad inalt de pericol in a infecta si alte persoane, in mod particular ceilalti membrii ai familiei, carora in mod frecvent li se prescrive acelasi tratament aplicat bolnavului.

Aggiornato al Giugno 2003

Tradotto da Cooperativa INTEGRA

Con il contributo della Provincia di Modena.

Pentru a avea mai multe informatii adreseazate la :  
Per saperne di più rivolgersi a :