

СИФИЛИС – SIFILIDE

Сифилис – это инфекционное заболевание, вызванное бактерией Бледная трепонема. Сифилис - очень серьёзная болезнь, которая поражает весь организм, и при отсутствии лечения может быть причиной кардиопатий, умственной отсталости, слепоты, паралича и смерти. Сифилисом можно заразиться при непосредственном сексуальном контакте с больным человеком (секс оральный, анальный или вагинальный) – приобретённый сифилис, но может передаваться также от больной матери плоду – врождённый сифилис.

Врождённый сифилис вызывает смерть плода в 40% случаев, либо рождение больных детей, страдающих слепотой и другими серьёзными поражениями органов.

При заражении сифилисом возрастает также риск заражения ВИЧ, вирусом, вызывающим СПИД.

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Первый признак сифилиса – как правило, язвочка, небольшая безболезненная ранка (сифилома) в месте сексуального контакта (половой член, влагалище, анус, прямая кишка, рот), сопровождаемая увеличением близлежащих лимфоузлов. Язвочка появляется обычно через 2-6 недель после заражения и исчезает через несколько недель.

Последующие стадии характеризуются лихорадкой, обширными высыпаниями на коже и увеличением лимфоузлов по всему телу (вторичная стадия). Но и эти поражения исчезают неожиданно сами по себе через 20-70 дней без следа. При отсутствии лечения, через несколько месяцев наступает третичная стадия сифилиса. На этой стадии поражаются кожные покровы, нервная и сердечно-сосудистая системы, кроме того, могут быть поражены все жизненные системы и органы.

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ТЫ ЗАРАЗИЛСЯ

Возможно провести серологический тест (анализ крови), который может диагностировать инфекцию даже при отсутствии симптомов. Этот тест проходят в общем порядке все беременные женщины в первом триместре беременности.

Сифилис можно диагностировать также по микроскопическому анализу образца сифиломы.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНИ

Меры профилактики сифилиса основываются на соблюдении корректных норм поведения: ограничении числа половых партнёров и использовании презервативов, особенно при случайных контактах.

- В случае заражения избегать сексуальных контактов до полного выздоровления и убедиться, что и твой партнёр прошёл необходимое лечение, во избежание повторного заражения
- Если ты беременна, обратись к своему гинекологу для проведения стандартного серологического теста: **профилактика и диагностика врождённого сифилиса зависят от своевременного диагноза, поставленного будущей матери.** Если во время беременности у тебя были случайный половые контакты, обязательно повтори анализ крови, и не забывай использовать презерватив.

Обновлено в июне 2003/Aggiornato al giugno 2003

Перевод: кооператив Интегра/Tradotto da Cooperativa Integra

При участии Провинции Модены/Con il contributo della Provincia di Modena

Для более подробной информации обращайтесь: /Per saperne di più rivolgersi a: