

КОНДИЛОМЫ - CONDILOMI

Кондиломы, в просторечье называемые “петушиный гребень”, вызываются вирусом папиллома (HPV). Существует множество типов этого вируса: одни вызывают бородавки на коже, другие – кондиломы гениталий, третьи – более серьёзные заболевания. Болезнь передаётся преимущественно половым путём, и инкубационный период может длиться от нескольких недель до нескольких лет. Инфекция гениталий считается самой распространённой и часто встречающейся. **Заболевание достаточно серьёзное, так как может спровоцировать рак шейки матки.**

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Кондиломы представляют собой небольшие розоватые наросты с шероховатой поверхностью (отсюда и название “петушиный гребень”). При отсутствии лечения могут разрастись и принять форму соцветий цветной капусты. Кондиломы могут локализоваться в любой зоне гениталий, как у мужчин так и у женщин, предпочитая более закрытые и влажные части. В случае орально-сексуальных контактов, кондиломы могут локализоваться на слизистой ротовой полости.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ КОНДИЛОМ (ВИРУС HPV)

За исключением генетической предрасположенности, всё, что подавляет иммунную систему организма , может вызвать возникновение папилломавирусной инфекции или ухудшение состояния уже существующих поражений. Бросить курить, заниматься спортом, избегать наркотиков и алкоголя, заниматься безопасным сексом – вот средства , которые способствуют укреплению собственной иммунной системы, и, соответственно могут влиять на возникновение или развитие болезни

Презерватив не защищает вас на 100%, хотя и уменьшает возможность заражения. Вирус очень нестойк вне человеческого тела , и поэтому нет необходимости применять особые меры предосторожности в отношении нижнего белья, сверх обычной ежедневной гигиены

Лучший способ профилактики возможных онкологических заболеваний, вызванных наличием в организме папилломавируса, - регулярно проходить ПАП-тест и кольпоскопию (частоту контрольных проверок вам укажет врач-специалист, в зависимости от степени поражения организма вирусом).

Если ты беременна, при наличии обнадеживающих результатов вышеуказанных анализов, особых рисков не существует.

Иногда во время беременности кондиломы гениталий могут увеличиться в количестве и размерах, но вряд ли осложнят роды, которые могут спокойно проходить обычным вагинальным путём. Во время беременности можно проходить как ПАП-тест, так и кольпоскопию.

Обновлено в июне 2003/Aggiornato al giugno 2003

Перевод: кооператив Интегра/Tradotto da Cooperativa Integra

При участии Провинции Модены/Con il contributo della Provincia di Modena

Для более подробной информации обращайтесь: /Per saperne di più rivolgersi a: