

# SIFILIDE

آنشک ایک متعدی مرض ہے جو کہ ایک دسخر یا کے ذریعہ ہوتا ہے جس کو تیرپہ نیا پلیدم کہتے ہیں۔ آنشک ایک بڑی خطرناک آفتیجین ہے جو کہ پورے جسم میں پھیل جاتی ہے اور اگر اس کا صحیح علاج نہ کیا جائے تو یہ دل کی بھاریوں، پاگل پن، اندھا پن، فالج، اور موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ آنشک کی آفتیجین برائے راست جنسی تعلقات (ہر قسم کے) یا انفرادی آفتیجین (کسی دوسرے سے) آنشک کا مرض لینے سے) ہو سکتی ہے، مگر اس کے علاوہ اس سے متاثرہ ماں سے بھی منتقل ہو سکتی ہے

یہ مال والی آنکھ کی قسم چالیس فیصد کمزور میں ہے کی موت کا باعث بن سکتی ہے یا پھر اندھے سے یا معذور سے کی پیدائش کا باعث بن سکتی ہے  
آنکھ کی انفیکشن اچھوتی کی یا انفیکشن کے دو ہفتے کا باعث بھی بن سکتی ہے جو کہ ایسا اور اس سے جو ایلز کا سبب بنتا ہے

بیماری کیسے ظاہر ہوتی ہے

آتشک کی پہلی علامت اکثر ایک ناسور کی شکل میں رونما ہوتی ہے، ایک زخم جو کہ جنسی اعضاء کے قریب یا منہ میں نمودار ہو تا ہے جس کے نزدیک غدود بڑھ جاتی ہیں۔ زخم اکثر انفیکشن کے دو سے چھ ہفتے کے بعد نمودار ہو تا ہے اور کچھ ہفتوں بعد غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں خار، اور ت جلد کی خرابی، پورے جسم میں سو جھ کی شکل میں اور مختلف غدود کے بڑھنے کی شکل میں ظاہر ہو تا ہے۔ اور یہ زخم بھی جلد سے پکس سے ستر دنوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے اور کوئی نشان باقی نہیں چھوڑتے۔ علاج نہ کروانے کی شکل میں، تھوڑے مہینوں بعد، مایاں اور آتشک کا تیسرا مرحلہ شروع ہو تا ہے۔ اس مرحلے میں جلد کو نقصان پہنچتا ہے، دل کی شریایوں اور نروس سسٹم پر حملہ ہو تا ہے، اس کے علاوہ تمام اہل گنہگار اور سسٹم بھی متاثر ہو سکتے ہیں

اگر انفیکشن ہو گئی ہے تو کیا کیا جائے

ایک ایسا خون کا ٹیٹ ایسا موجود ہے جس کے ذریعے اس کی تشخیص ممکن ہے چاہے علامات ظاہر نہ بھی ہوئی ہوں۔ یہ ٹیٹ ان تمام عورتوں کے روٹین کے ٹیٹ میں موجود ہے جو حاملہ ہوتی ہیں۔ ان کے حمل کے پہلے تین ماہ کے عرصے کے دوران۔

پیر ۱۰) کے حمل کے پہلے تین ماہ کے عرصے کے دوران۔