

PROVA PRATICA N. 2



La degenza media (DM) è il tempo che un ospedale o una divisione/reparto impiega mediamente per completare un trattamento sanitario e dimettere il paziente.

Nella seconda decade di marzo i 4 letti (1, 2, 3, 4) di un reparto di terapia intensiva vengono occupati da 8 pazienti (A, B, C, D, E, F, G, H) nel modo seguente

	DATA	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Letto	1	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B
Letto	2	C	C	C				D	D	D	D
Letto	3				E	E	E	E	E	F	F
Letto	4	G	G	G	G	H	H	H	H	H	H
	Presenti	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4

Calcola la degenza media (DM) del reparto nel periodo indicato in tabella.

PROVA PRATICA N.3

MBS
reg Am



Le linee di intervento ministeriali per la riduzione dei tempi di attesa dei ricoveri ospedalieri programmati indicano Classi di priorità con relativi tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità e indicazioni specifiche.

Elencare Classi di priorità e relative indicazioni nella seguente Tabella:

Classe di priorità	Tempi massimi e Indicazioni

PROVA PRATICA N. 1

MRS
MS *Mu*



Il Servizio di Igiene Ospedaliera deve dare istruzioni su come procedere alla vestizione e svestizione dei DPI per il personale di assistenza che lavora in un reparto intensivo ad alto rischio di infezioni da SARS.

1) Mettere in sequenza logica le seguenti operazioni di vestizione (nell'antistanza/zona filtro):

indossare un primo paio di guanti ; togliere ogni monile e oggetto personale ; indossare gli occhiali di protezione ; praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica; indossare la tuta o il camice monouso ; controllare l'integrità dei dispositivi e non utilizzare dispositivi non integri ; indossare un secondo paio di guanti ; indossare idoneo filtrante facciale.

2) Mettere in sequenza logica le seguenti operazioni di svestizione (nell'antistanza/zona filtro):

rimuovere gli occhiali e sanificarli ; rimuovere il camice o la tuta (con o senza l'assistenza di un operatore); igienizzare le mani ancora con i guanti (consigliato); rimuovere i guanti, smaltirli nel biobox e igienizzare le mani ; rimuovere il filtrante facciale maneggiandolo dalla parte posteriore e smaltirlo nel contenitore; indossare un secondo paio di guanti nuovi ; praticare l'igiene finale delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone; rimuovere il secondo paio di guanti .