


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

# OKkio alla SALUTE

## Risultati dell'indagine 2014

### AUSL di MODENA



OKkio alla SALUTE nel 2014 è stato realizzato grazie al finanziamento del Ministero della Salute/Centro per la prevenzione ed il Controllo delle Malattie (Progetto “Supporto al coordinamento delle sorveglianze su stili vita e determinanti di malattie croniche in diverse età”)

**A cura di:**

Simona Midili, Alberto Tripodi, Jenny Pinca, Ylenja Persi, Giuliano Carrozzi, M. Rita Fontana, Giulia Annovi

**Hanno contribuito alla realizzazione della raccolta dati 2014****- a livello nazionale:**

Angela Spinelli, Paola Nardone, Marta Buoncristiano, Laura Lauria, Mauro Bucciarelli, Silvia Andreozzi, Marina Pediconi, Ferdinando Timperi, Enrica Pizzi (Gruppo di coordinamento nazionale - CNESPS, Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute – Istituto Superiore di Sanità); Daniela Galeone, Maria Teresa Menzano (Ministero della Salute); Alessandro Vienna (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Marta Buoncristiano, Giulia Cairella, Marcello Caputo, Margherita Caroli, Chiara Cattaneo, Laura Censi, Barbara De Mei, Daniela Galeone, Mariano Giacchi, Giordano Giostra, Anna Lamberti, Laura Lauria, Gianfranco Mazzeola, Paola Nardone, Giuseppe Perri, Anna Rita Silvestri, Angela Spinelli, Lorenzo Spizzichino, Alessandro Vienna (Comitato Tecnico OKkio alla SALUTE)

**- a livello regionale:**

Paola Angelini, Marina Fridel (Assessorato Politiche per la Salute)  
Giuliano Carrozzi, Lara Bolognesi, Roberto Roveta, Alberto Tripodi (Ausl Modena)  
Nicoletta Bertozzi (Ausl Cesena), Simona Nascetti (Ausl Bologna)  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

**- a livello provinciale:**

Uffici Ambiti territoriali di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini

**- a livello aziendale:****Referenti e operatori**

Ausl Piacenza	Giuseppe Melandri, Elena Cammi, Maria Rita Prazzoli, Cristina Sartori, Cristian Bulla, Lorena Mori, Laura Rossi.
Ausl Parma	Sandra Vattini, Nicola Bolsi, Giuseppe Patanè, Elena Felloni, Elena Cerati, Alessia Miduri, Joseè Barbuti, Ginevra Zurla.
Ausl Reggio Emilia	Alessandra Fabbri, Claudia Della Giustina Chiara Luppi, Alessandra Palomba, Federica Ferrari, Eugenia Carluccio.
Ausl Modena	Simona Midili, Alberto Tripodi, Ylenja Persi, Jenny Pinca, Giuliano Carrozzi, Giulia Annovi, Alice Bonora, Lara Bolognesi, Alessio Borghi, Valerio Di Grazia, Beatrice Malavasi, Valentina Masi, Suelen Rocha, Roberto Roveta, Andrade De Souza, Alessandra Varsos, Valentina Vivaccia.
Ausl Bologna	Emilia Guberti, Simonetta De Giorgi, Claudia Mazzetti, Paola Navacchia, Elena Aprile, Laurotta Bianco, Francesca Celenza, Cristina Coppini, Maria Rosa Fiorentino, Valentina Laudani, Simona Nascetti, Barbara Perticarà, Monica Negosanti, Jessica Maestrini, Sara Princivalle, Chiara Rizzoli, Marika Sardo Cardalano, Amalia Scuderi, Cinzia Tarini.
Ausl Imola	Ivana Stefanelli.
Ausl Ferrara	Lucio Andreotti, Nelly Bigliardi, Mirella Brancaleoni, Fabia Busi, Pacifico Stefania; Tonioli Ambra, Vecchiatini Laura.
Ausl Romagna (Cesena)	Roberta Cecchetti, Melissa Pasini, Francesco Domeniconi, Luana Pieri, Loretta Bagnolini, Vannia Ricci, Nicoletta Bertozzi, Laura Sardonini.
Ausl Romagna (Forlì)	Cortesi Claudia, Chiara Tomasini, Ferrigno Francesca Paola Orlati Emilia Biguzzi, Daniela Biondi, Silvia Lelli Casadei, Simona Fabbri, Roberta Farneti, Giuditta Farolfi, Maria Cristina Filippi, Paola Grimellini, Giuseppina Impagnatiello, Maria Lamberti, Manuela Nanni, Roberta Perini, Milva Zoli
Ausl Romagna (Ravenna)	Gabriella Paganelli, Elena Biondi, Sonia Coveri, Gloria Pia Di Nocco, Mara Federici, Denise Regazzi.
Ausl Romagna (Rimini)	Fausto Fabbri, Carla Biavati, Anna Capolongo, Annamaria Rauti, Catia Silighini, Marta Ciammilli, Martina Molari.

Un ringraziamento particolare ai dirigenti scolastici e agli insegnanti che hanno partecipato intensamente alla realizzazione dell'iniziativa: il loro contributo è stato determinante per la buona riuscita della raccolta dei dati qui presentati (i nomi non vengono citati per proteggere la privacy dei loro alunni che hanno partecipato alla raccolta dei dati).

Un ringraziamento alle famiglie e agli alunni che hanno preso parte all'iniziativa, permettendo così di comprendere meglio la situazione dei bambini della nostra Ausl, in vista dell'avvio di azioni di promozione della salute.

**Copia del volume può essere richiesta a:**

Simona Midili

e-mail: [s.midili@ausl.mo.it](mailto:s.midili@ausl.mo.it)

[www.ausl.mo.it/dsp/okkio](http://www.ausl.mo.it/dsp/okkio)

**Siti internet di riferimento per lo studio:**

[www.okkioallasalute.it](http://www.okkioallasalute.it); [www.epicentro.iss.it/okkioallasalute](http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute)

# INDICE

---

Prefazione

Introduzione

Metodologia

Descrizione della popolazione

Lo stato ponderale dei bambini

Le abitudini alimentari dei bambini

L'uso del tempo dei bambini: l'attività fisica

L'uso del tempo dei bambini: le attività sedentarie

La percezione delle madri sulla situazione nutrizionale e sull'attività fisica dei bambini

L'ambiente scolastico e il suo ruolo nella promozione di una sana alimentazione e dell'attività fisica

Conclusioni generali

Materiali bibliografici

## PREFAZIONE

---

Nell'anno 2014 si è realizzata la quarta rilevazione del progetto nazionale "OKkio alla Salute", in grado di fornire informazioni dettagliate sulle abitudini alimentari e motorie dei bambini di 8-9 anni e rispettive famiglie e sul ruolo della scuola nel promuovere sani comportamenti.

Oltre all'indubbio valore scientifico dell'indagine, essa ha come ulteriore merito, quello di avere in qualche caso attivato, ed in altri rafforzato la collaborazione fra istituzioni scolastiche ed azienda sanitaria, condizione che ha favorito lo sviluppo di una maggiore sensibilità delle prime sul tema dei sani stili di vita e per tutti l'opportunità di implementare iniziative condivise finalizzate a migliorare l'educazione dei giovani e delle loro famiglie su questi temi.

Va inoltre segnalata la piena collaborazione da parte dei genitori, che nella quasi totalità dei casi ha assentito che il proprio figlio partecipasse all'indagine, che prevedeva non solo l'acquisizione di dati attraverso l'uso di questionari, ma anche la misurazione diretta di peso ed altezza dei bambini a scuola.

Dal confronto dei dati ricavati nell'indagine del 2014 rispetto a quelli delle precedenti edizioni si osserva, pur con oscillazioni che possono considerarsi fisiologiche in un'indagine campionaria di ridotte dimensioni, una sostanziale stabilità della prevalenza di eccesso di peso (sovrappeso+obesità) nei bambini di 8-9 anni, i quali, in circa 1/3 dei casi, rientrano in questa situazione.

Va comunque sottolineato che a livello nazionale sembra esserci una progressiva, seppur lieve, riduzione della prevalenza di sovrappeso ed obesità nella fascia di età esaminata dall'indagine "OKkio alla Salute", dato che appare incoraggiante e spinge a proseguire ed intensificare, anche nell'ambito della programmazione sanitaria territoriale, le iniziative di promozione di sane abitudini alimentari e di una regolare attività fisica.

A questo proposito, è ormai chiaro che, per poter ottenere miglioramenti degli stili di vita nella popolazione, specie in riferimento alle giovani generazioni, è necessario operare attraverso reti territoriali di soggetti aventi ruolo e competenza educativa, affinché vengano diffusi messaggi e comportamenti coerenti nei vari ambiti in cui il bambino vive; tali iniziative, che in provincia di Modena sono attive da quasi 10 anni, si definiscono "Progetti di Comunità", e rappresentano una delle principali cornici metodologiche all'interno delle quali sviluppare l'attività di promozione della salute nel Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 dell'Emilia Romagna.

Parlando di bambini e di ragazzi, ecco che la scuola e la famiglia rappresentano i nodi fondamentali di tale rete, e l'esperienza condotta attraverso i progetti di sorveglianza, come l'indagine OKkio alla Salute, ha rappresentato, come già accennato in precedenza, un modo per rafforzarne la connessione educativa.

***Davide Ferrari***

Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica  
AUSL di Modena

## INTRODUZIONE

---

A livello internazionale è ormai riconosciuto che il sovrappeso e l'obesità sono un fattore di rischio per l'insorgenza di patologie cronico-degenerative e una sfida prioritaria per la sanità pubblica.

In particolare, l'obesità e il sovrappeso in età infantile hanno delle implicazioni dirette sulla salute del bambino e rappresentano un fattore di rischio per lo sviluppo di gravi patologie in età adulta.

Per comprendere la dimensione del fenomeno nei bambini italiani e i comportamenti associati, a partire dal 2007, il Ministero della Salute/CCM ha promosso e finanziato lo sviluppo e l'implementazione nel tempo del sistema di sorveglianza OKkio alla SALUTE, coordinato dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità e condotto in collaborazione con le Regioni e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La sorveglianza è alla base delle strategie italiane in materia di prevenzione e promozione della salute quali il Programma Governativo "Guadagnare salute" e il Piano Nazionale della Prevenzione e, in ambito internazionale, aderisce al progetto "Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

OKkio alla SALUTE, che ha una periodicità di raccolta dati biennale, ha lo scopo di descrivere la variabilità geografica e l'evoluzione nel tempo dello stato ponderale, degli stili alimentari, dell'abitudine all'esercizio fisico dei bambini della terza classe primaria e delle attività scolastiche favorevoli alla sana nutrizione e l'attività fisica.

Ad oggi, a livello nazionale, sono state effettuate quattro raccolte dati (2008-9, 2010, 2012 e 2014) ognuna delle quali ha coinvolto oltre 40.000 bambini e genitori e 2000 scuole.

In particolare, nel 2014 hanno partecipato 2.672 classi, 48.426 bambini e 50.638 genitori, distribuiti in tutte le regioni italiane.

I bambini in sovrappeso sono il 20,9% [IC95% 20,4-21,4] e i bambini obesi sono il 9,8% [IC95% 9,5-10,2], compresi i bambini severamente obesi che da soli sono il 2,2% [IC95% 2,1-2,4]. Si registrano prevalenze più alte nelle regioni del sud e del centro. Si evidenzia una leggera e progressiva diminuzione del fenomeno nel corso degli anni. Persistono tra i bambini le abitudini alimentari scorrette seppur in lieve miglioramento rispetto alle precedenti raccolte; infatti, l'8% dei bambini salta la prima colazione e il 31% fa una colazione non adeguata (ossia sbilanciata in termini di carboidrati e proteine); il 52% fa una merenda di metà mattina abbondante, mentre il 25% dei genitori dichiara che i propri figli non consumano quotidianamente frutta e/o verdura e il 41% dichiara che i propri figli consumano abitualmente bevande zuccherate e/o gassate. Anche i valori dell'inattività fisica e dei comportamenti sedentari, pur mostrando un miglioramento rispetto al passato, permangono elevati: il 18% dei bambini pratica sport per non più di un'ora a settimana, il 16% non ha fatto attività fisica il giorno precedente l'indagine, il 42% ha la TV in camera, il 35% guarda la TV e/o gioca con i videogiochi per più di 2 ore al giorno e solo un bambino su 4 si reca a scuola a piedi o in bicicletta. Dati simili a quelli osservati nelle precedenti rilevazioni confermano l'errata percezione dei genitori dello stato ponderale e dell'attività motoria dei propri figli: tra le madri di bambini in sovrappeso o obesi, il 38% ritiene che il proprio figlio sia sotto-normopeso.

Inoltre, grazie alla partecipazione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, è stato possibile raccogliere informazioni sulla struttura degli impianti, sui programmi didattici e sulle iniziative di promozione della sana nutrizione e dell'attività fisica degli alunni in 2.408 plessi di scuole primarie italiane. I principali risultati evidenziano che il 74% delle scuole possiede una mensa; il 55% prevede la distribuzione per la merenda di metà mattina di alimenti salutari (frutta, yogurt ecc.); il 60% delle classi svolge due ore di attività motoria a settimana. Inoltre, solo 1 scuola su 3 ha coinvolto i genitori in iniziative favorevoli a una sana alimentazione e in quelle riguardanti l'attività motoria.

Grazie al grande lavoro svolto dai professionisti della salute e della scuola, OKkio alla SALUTE ha permesso di disporre di dati aggiornati e confrontabili sulla prevalenza di sovrappeso e obesità in età infantile, sullo stile di vita dei bambini e sulle attività scolastiche di promozione della salute. Inoltre, nel tempo ha dimostrato di avere caratteristiche di semplicità, affidabilità e flessibilità ed è, quindi, un valido strumento per supportare gli operatori di sanità pubblica nell'identificare i comportamenti a rischio maggiormente diffusi e nel definire le modalità per prevenirli e contrastarli. Nel report vengono presentati i risultati della raccolta dati effettuata nel 2014.

## METODOLOGIA

---

L'approccio adottato è quello della sorveglianza di popolazione, basata su indagini epidemiologiche ripetute a cadenza regolare, su campioni rappresentativi della popolazione in studio.

La sorveglianza è orientata alla raccolta di poche informazioni basilari, mediante l'utilizzo di strumenti e procedure semplici, accettabili da operatori e cittadini e sostenibili dai sistemi di salute. In tal senso, la sorveglianza non è adatta ad un'analisi approfondita delle cause del sovrappeso e dell'obesità (che possono essere oggetto di specifici studi epidemiologici), e non permette lo *screening* e l'avvio al trattamento dei bambini in condizioni di sovrappeso o obesità (cosa invece possibile con una attività di screening condotta sull'intera popolazione).

### **Popolazione in studio**

Le scuole rappresentano l'ambiente ideale per la sorveglianza: i bambini sono facilmente raggiungibili sia per la raccolta dei dati che per gli interventi di promozione della salute che seguiranno la sorveglianza.

È stata scelta la classe terza della scuola primaria, con bambini intorno agli 8 anni, perché l'accrescimento a quest'età è ancora poco influenzato dalla pubertà, i bambini sono già in grado di rispondere con attendibilità ad alcune semplici domande e i dati sono comparabili con quelli raccolti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in vari altri Paesi europei.

In Italia la popolazione di tutte le classi primarie, cui si potranno ragionevolmente estendere molti dei risultati ottenuti, è di circa 3 milioni.

### **Modalità di campionamento**

Il metodo di campionamento prescelto è quello "a grappolo". In questo modo possono essere estratte le classi ("grappoli" o "*cluster*") dalle liste di campionamento predisposte dagli Uffici Scolastici su base regionale o di ASL. Per ciascuna scuola la probabilità di veder estratte le proprie classi è proporzionale al numero degli alunni iscritti (metodo della *probability proportional to size*).

I vantaggi pratici di questo tipo di campionamento sono la possibilità di concentrare il lavoro delle equipe su un numero limitato di classi (il metodo classico "casuale semplice" richiederebbe di effettuare rilevazioni in quasi tutte le scuole di una ASL) e la possibilità di fare a meno di una lista nominativa degli alunni, in genere non disponibile (vengono arruolati nell'indagine tutti gli alunni appartenenti alle classi campionate).

La numerosità campionaria è stata individuata per ogni regione, ASL o macro area sulla base della popolazione di bambini di classe terza primaria residenti, sulla prevalenza dell'eccesso ponderale riscontrato nella precedente raccolta dei dati e al *design effect*, con una precisione della stima del 3% per la regione e del 5% per la asl.

### **Strumenti e procedure di raccolta dati**

Nel 2008 è stata sviluppata la prima versione dei 4 questionari di OKkio alla SALUTE. Dopo la conclusione della prima raccolta dati e dello studio di approfondimento "ZOOM8" condotto dall'INRAN, che ha evidenziato la necessità di apportare alcune integrazioni ai testi, è stata elaborata una versione successiva dei questionari di OKkio alla SALUTE utilizzata nel 2010 e nel 2012. Nel 2014, in accordo con il Comitato Tecnico di OKkio alla SALUTE, sono state introdotte nei questionari quattro nuove domande, una per ogni questionario, riguardanti: l'igiene orale, le ore di sonno dei bambini nei giorni feriali, i bambini che indossano gli occhiali da vista, il rispetto del divieto di fumo negli spazi aperti della scuola.

I quattro questionari sono: uno da somministrare ai bambini in aula, uno per i genitori da compilare a casa e due destinati rispettivamente agli insegnanti e ai dirigenti scolastici.

Il questionario per i bambini comprende semplici domande riferite a un periodo di tempo limitato (dal pomeriggio della giornata precedente alla mattina della rilevazione). I bambini hanno risposto al questionario in aula, individualmente e per iscritto, e gli operatori si sono resi disponibili per chiarire eventuali dubbi.

Inoltre i bambini sono stati misurati (peso e statura) da operatori locali addestrati utilizzando bilancia Seca872<sup>TM</sup> e Seca874<sup>TM</sup> con precisione di 50 grammi e stadiometro Seca214<sup>TM</sup> e Seca217<sup>TM</sup> con precisione di 1 millimetro. In caso di esplicito rifiuto dei genitori, il questionario non è stato



somministrato e i bambini non sono stati misurati. Non è stata prevista alcuna forma di recupero dei dati riguardanti i bambini assenti, né di sostituzione dei bambini con rifiuto.

Per stimare la prevalenza di sovrappeso e obesità è stato utilizzato l'Indice di Massa Corporea (IMC), ottenuto come rapporto tra il peso espresso in chilogrammi al netto della tara dei vestiti e il quadrato dell'altezza espressa in metri, misura che ben si presta ai fini della sorveglianza per l'analisi dei trend temporali e della variabilità geografica e ampiamente utilizzata a livello internazionale. Per la definizione del sottopeso, normopeso, sovrappeso, obeso e severamente obeso si è scelto di utilizzare i valori soglia per l'IMC desunti da Cole et al., come consigliato dalla International Obesity Task Force (IOTF). In particolare, nell'analisi dei dati sono stati considerati come sottopeso i bambini con un valore di IMC uguale o inferiore a 17 in età adulta ed è stato possibile, inoltre, calcolare la quota di bambini severamente obesi, ovvero con un valore di IMC in età adulta pari o superiore a 35 (Cole et al., 2012).

Le domande rivolte ai genitori hanno indagato alcune abitudini dei propri figli quali: l'attività fisica, i comportamenti sedentari (videogiochi e televisione) e gli alimenti consumati. Inoltre, è stata indagata nei genitori la percezione dello stato nutrizionale e del livello di attività motoria dei propri figli.

Alcuni dati sulle caratteristiche dell'ambiente scolastico, in grado di influire favorevolmente sulla salute dei bambini, sono stati raccolti attraverso i due questionari destinati ai dirigenti scolastici e agli insegnanti.

Particolare attenzione è stata riservata alle attività di educazione motoria e sportiva curricolare, alla gestione delle mense, alla presenza di distributori automatici di alimenti, alla realizzazione di programmi di educazione alimentare. È stato poi richiesto un giudizio ai dirigenti scolastici sull'ambiente urbano che circonda la scuola e la qualità dei servizi presenti e usufruibili dagli alunni.

La collaborazione intensa e positiva tra operatori sanitari e istituzioni scolastiche ha permesso un ampio coinvolgimento dei bambini e dei loro genitori contribuendo alla buona riuscita dell'iniziativa. In particolare, la disponibilità e l'efficienza degli insegnanti ha consentito di raggiungere un livello di adesione delle famiglie molto alto.

La raccolta dei dati è avvenuta in tutte le regioni tra marzo e maggio 2014.

L'inserimento dei dati è stato effettuato dagli stessi operatori sanitari che hanno realizzato la raccolta cartacea delle informazioni, mediante un software sviluppato ad hoc da una ditta incaricata dall'Istituto Superiore di Sanità.

### ***Analisi dei dati***

Trattandosi di uno studio trasversale che si prefigge di misurare delle prevalenze puntuali, l'analisi dei dati è consistita principalmente nella misura di percentuali (prevalenze) delle più importanti variabili selezionate. Per alcune di queste, in particolare per quelle che saranno soggette a confronti temporali successivi o con altre realtà territoriali (Regioni o ASL), sono stati calcolati anche gli intervalli di confidenza al 95%. In qualche caso, al fine di identificare alcuni gruppi a rischio, sono stati calcolati dei rapporti di prevalenza e realizzati dei test statistici (Test esatto di Fisher o del Chi quadrato). Nel presente rapporto, dove opportuno, viene indicato se le differenze osservate tra le 4 rilevazioni sono o non sono statisticamente significative. Data la ridotta numerosità del campione aziendale, rispetto a quello nazionale o regionale, e di conseguenza intervalli di confidenza generalmente più ampi, è necessaria la massima cautela nell'interpretare e commentare i confronti negli anni dei dati al fine di evitare assunzioni e conclusioni errate. Questa annotazione vale in particolar modo per i risultati relativi all'ambiente scolastico, in cui il campione è di circa 20-30 scuole.

Le analisi sono state effettuate usando il software Stata vers. 11.0, seguendo un piano d'analisi predisposto nel protocollo dell'indagine.

## DESCRIZIONE DELLA POPOLAZIONE

La raccolta dati ha richiesto la partecipazione attiva delle scuole, delle classi, dei bambini e dei loro genitori. Di seguito sono riportati i tassi di risposta e le descrizioni delle varie componenti della popolazione coinvolta.

### **Quante scuole e quante classi sono state coinvolte nell'indagine?**

Nel 2014 nella Ausl di Modena hanno partecipato all'indagine il 100% delle scuole ed il 100% delle classi sulle 22 scuole e sulle 27 classi rispettivamente campionate.

**Distribuzione delle classi  
per tipologia di comune di appartenenza  
AUSL Modena – OKkio 2014 (N=27 classi)**


- Le scuole e le classi partecipanti si trovano in comuni con diversa densità di popolazione.
- Per la classificazione della tipologia dei comuni si è seguito il sistema adottato dall'Istat.

Zona abitativa	N	%
≤ 10.000 abitanti	3	11
Da 10.000a più di 50.000 abitanti	13	48
> 50.000 abitanti (non metropolitana)	11	41
Comuni di area metropolitana (centro e periferia)	0	0

### **Partecipazione dei bambini e delle famiglie allo studio**

La misura della "risposta" delle famiglie, ovvero la percentuale di bambini/famiglie che ha partecipato all'indagine, è un importante indicatore di processo. Una percentuale molto alta, oltre a garantire la rappresentatività del campione, dimostra l'efficacia delle fasi preparatorie dell'indagine. Una risposta bassa a causa non solo di un alto numero di rifiuti ma anche di assenti, maggiore di quanto ci si attenderebbe in una normale giornata di scuola (5-10%), potrebbe far sospettare una scelta delle famiglie dettata per esempio dalla necessità di "proteggere" i bambini sovrappeso/obesi. In questo caso, il campione di bambini delle classi selezionate potrebbe non essere sufficientemente rappresentativo dell'insieme di tutte le classi della Ausl, in quanto la prevalenza di obesità riscontrata nei bambini misurati potrebbe essere significativamente diversa da quella degli assenti.

### **Bambini coinvolti: quanti i partecipanti, i rifiuti e gli assenti?**



- ◆ Solo l' 1% dei genitori ha rifiutato la misurazione dei propri figli. Questo valore è risultato inferiore a quello nazionale (3%). Questo dato sottolinea una buona gestione della comunicazione tra AUSL, scuola e genitori
- ◆ Nella giornata della misurazione erano assenti 22 bambini pari al 4% del totale di quelli iscritti; generalmente la percentuale di assenti è del 5-10%. La bassa percentuale di assenti tra i consensi rassicura, al pari del favorevole dato sui rifiuti, sull'attiva e convinta partecipazione dei bambini e dei genitori.
- ◆ I bambini ai quali è stato possibile somministrare il questionario e di cui sono stati rilevati peso e altezza sono stati quindi 556 ovvero il 95% degli iscritti negli elenchi delle classi. L'alta percentuale di partecipazione assicura una rappresentatività del campione molto soddisfacente.
- ◆ Hanno risposto al questionario dei genitori 559 delle famiglie dei 586 bambini iscritti (95%).

### ***Bambini partecipanti: quali le loro caratteristiche?***

Le soglie utilizzate per classificare lo stato ponderale variano in rapporto al sesso e all'età dei bambini considerati, pertanto è necessario tener conto della loro distribuzione.

		<b>Età e sesso dei bambini</b>	
		<b>AUSL Modena – OKkio 2014</b>	
<b>Caratteristiche</b>		<b>n</b>	<b>%</b>
◆ La proporzione di maschi e di femmine nel nostro campione è simile.			
<b>Età in anni</b>			
	≤ 7	1	0,2
◆ Al momento della rilevazione, la grande maggioranza dei bambini che ha partecipato allo studio aveva fra 8 e 9 anni, con una media di 8 anni e 10 mesi di vita.	8	312	56,3
	9	235	42,4
	≥ 10	6	1,1
<b>Sesso</b>			
	Maschi	291	52,5
	Femmine	263	47,5

Nella scheda antropometrica del questionario 2014 è stata inserita una specifica, a cura dell'operatore, per registrare l'uso degli occhiali da vista nei bambini.

Nella nostra Ausl il 16,4 % dei bambini indossa gli occhiali.

## **Genitori partecipanti: chi sono e cosa fanno?**

La scolarità dei genitori, usata come indicatore socioeconomico della famiglia, è associata in molti studi allo stato di salute del bambino. Il questionario è stato compilato più spesso dalla madre del bambino (82,7%), meno frequentemente dal padre (16,2%) o da altra persona (1,1%). Di seguito vengono riportate le caratteristiche di entrambi i genitori dei bambini coinvolti; i capitoli successivi nella maggior parte dei casi presenteranno analisi che tengono conto del livello di istruzione solo della madre che di fatto è la persona che ha risposto più frequentemente al questionario rivolto ai genitori.

- ◆ La maggior parte delle madri ha un titolo di scuola superiore (44,4%) ed il 24% è laureata.
- ◆ I padri che hanno un titolo di scuola superiore sono il 41,9% e la laurea il 20,2%.
- ◆ Il 21,9% delle madri e il 18,8% dei padri sono di nazionalità straniera.
- ◆ Il 40% delle madri lavora a tempo pieno mentre il 24,7% non svolge alcun lavoro.

**Livello di istruzione, occupazione e nazionalità della madre e del padre**  
AUSL Modena – OKkio 2014

<b>Caratteristiche</b>	<b>Madre</b>		<b>Padre</b>	
	<b>n</b>	<b>%</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
<b>Grado di istruzione</b>				
Nessuna, elementare, media	173	31,5	197	37,9
Diploma superiore	244	44,4	218	41,9
Laurea	132	24,0	105	20,2
<b>Nazionalità</b>				
Italiana	429	78,1	432	81,2
Straniera	120	21,9	100	18,8
<b>Lavoro*</b>				
Tempo pieno	183	39,9	-	-
Part time	162	35,4	-	-
Nessuno	113	24,7	-	-

\* Informazione raccolta solo sulla persona che compila il questionario; essendo la madre colei che lo compila nella grande maggioranza dei casi, il dato non è calcolabile per il padre.


## LO STATO PONDERALE DEI BAMBINI

L'obesità ed il sovrappeso in età evolutiva tendono a persistere in età adulta e a favorire lo sviluppo di gravi patologie quali le malattie cardio-cerebro-vascolari, diabete tipo 2 ed alcuni tumori. Negli ultimi 30 anni la prevalenza dell'obesità nei bambini è drasticamente aumentata. Accurate analisi dei costi della patologia e delle sue onerose conseguenze, sia considerando il danno sulla salute che l'investimento di risorse, hanno indotto l'OMS e anche il nostro Paese a definire la prevenzione dell'obesità come un obiettivo prioritario di salute pubblica.

È utile sottolineare che la presente indagine, sia per motivi metodologici che etici, non è e non va considerata come un intervento di screening e, pertanto, i suoi risultati non vanno utilizzati per la diagnosi e l'assunzione di misure sanitarie nel singolo individuo.

### **Quanti sono i bambini in sovrappeso o obesi?**

L'indice di massa corporea (IMC) è un indicatore indiretto dello stato di adiposità, semplice da misurare e comunemente utilizzato negli studi epidemiologici per valutare l'eccedenza ponderale (il rischio di sovrappeso e obesità) di popolazioni o gruppi di individui. Si ottiene dal rapporto tra il peso del soggetto espresso in chilogrammi diviso il quadrato della sua altezza espressa in metri. Per la determinazione di sottopeso, normopeso, sovrappeso, obeso e severamente obeso, sono stati utilizzati i valori soglia proposti da Cole et al. e raccomandati dall'IOTF. La misura periodica dell'IMC permette di monitorare nel tempo l'andamento del sovrappeso/obesità e dell'efficacia degli interventi di promozione della salute nonché di effettuare confronti tra popolazioni e aree diverse.




- ◆ Tra i bambini della nostra Ausl l'1,7% (IC95% 0,9%-3,1%) risulta in condizioni di obesità severa, il 7% risulta obeso (IC95% 5,2%-9,4%), il 24,4% sovrappeso (IC95% 20,8%-28,4%), il 65,1% normopeso (IC95% 60,4%-69,6%) e 1,8% sottopeso (IC95% 0,9%-3,6%).
- ◆ Complessivamente il 33% dei bambini presenta un eccesso ponderale termine che comprende sia sovrappeso che obesità.
- ◆ Se riportiamo la prevalenza di sovrappeso e obesità riscontrata in questa indagine a tutto il gruppo di bambini di età 6-11 anni, il numero di bambini sovrappeso e obesi nella AUSL al 1/1/2014 sarebbe pari a 11.171, di cui obesi 2911.

## Qual è la distribuzione dell'IMC della popolazione dei bambini studiati rispetto a una popolazione di riferimento?

La mediana (valore centrale) della distribuzione dell'IMC della nostra Ausl nel 2014 è pari a 17,3 ed è spostata verso destra, cioè valori più alti, rispetto a quella della popolazione internazionale di riferimento della stessa età (15,8). L'intervallo interquartile, misura di dispersione, è risultato pari a 4,1.


La figura di seguito riportata illustra l'andamento della distribuzione dell'indice di massa corporea nei bambini per il 2014.

### Distribuzione dell'IMC dei nostri bambini



Indice di massa corporea (kg/m<sup>2</sup>) dei bambini –OKkio alla SALUTE, 2014

Come mostrato nella figura successiva, rispetto alle precedenti rilevazioni nella nostra Ausl si assiste ad una sostanziale stabilità della prevalenza di bambini in sovrappeso e obesi.




Trend sovrappeso e obesità, OKkio alla SALUTE

## Qual è il rapporto tra IMC, caratteristiche del bambino e dei genitori?

In alcuni studi, il sesso del bambino, la zona geografica di abitazione, il livello di scolarità e lo stato ponderale dei genitori sono associati alla situazione di sovrappeso o obesità del bambino.

		Stato ponderale dei bambini di 8 e 9 anni per caratteristiche demografiche del bambino e della madre (%) Ausl di Modena -OKkio 2014		
Caratteristiche		Normo/ sottopeso	Sovrappeso	Obeso
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nella Ausl di Modena, le prevalenze di obesità e di sovrappeso sono simili tra i bambini di 8 e 9 anni e tra maschi e femmine.</li> </ul>	<b>Età</b>			
	8 anni	68,2	22,5	9,3
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bambini che frequentano scuole in centri con 10.000-50.000 ed in quelli con più di 50.000 abitanti risultano più obesi rispetto a coloro che frequentano scuole in centri con meno di 10.000 abitanti. Per converso, l'eccesso di peso (sovrappeso+obesità) sembra essere inferiore nelle aree con più di 50.000 abitanti.</li> </ul>	9 anni	65,4	26,9	7,7
	<b>Sesso</b>			
	maschi	65,8	25	9,2
	femmine	68,2	23,8	8,0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il rischio di obesità diminuisce con il crescere della scolarità della madre, da 12,7% per titolo di scuola elementare o media, a 6,9% per diploma di scuola superiore, a 4% per la laurea. Anche i valori di sovrappeso sembrano inferiori in bambini di madri laureate.</li> </ul>	<b>Zona abitativa*</b>			
	<10.000 abitanti	66	29,8	4,2
	10.000-50.000	61,6	29,4	9,0
	>50.000	73,5	17,4	9,1
	<b>Istruzione della madre*</b>			
	Nessuna, elementare, media	61,8	25,5	12,7
	Superiore	68,2	24,9	6,9
	Laurea	75,4	20,6	4

\* Differenza statisticamente significativa ( $p < 0,05$ )



È stato confrontato l'IMC del bambino rispetto a quello dei genitori ed è stato valutato, in particolare, l'eccesso di peso del bambino quando almeno uno dei genitori risulta essere sovrappeso o obeso.

- ◆ Dai dati autoriferiti dai genitori emerge che, nella nostra Ausl, il 19,1% delle madri è in sovrappeso e il 6,9% è obeso; i padri, invece, sono nel 41,9% sovrappeso e 11,2% obesi.
- ◆ Quando almeno uno dei due genitori è in sovrappeso il 23,5% dei bambini risulta in sovrappeso e il 5,2% obeso. Quando almeno un genitore è obeso il 33,3% dei bambini è in sovrappeso e il 21% obeso.\*

\* differenze statisticamente significative ( $p < 0.0001$ )

### **Nei giorni di scuola quante ore dormono i nostri bambini?**

In alcuni studi, le ore di sonno del bambino sembrano essere associate al suo stato ponderale. In virtù di ciò, quest'anno nel questionario rivolto al genitore del bambino è stata introdotta una nuova domanda volta a stimare le ore di sonno dei bambini nei giorni di scuola, ovvero non considerando i giorni festivi che possono rappresentare un'eccezione alle normali abitudini.

- Nella nostra Ausl i bambini dormono in media 9 ore 23 min.

Il 14% dei bambini dorme meno di 9 ore. A livello nazionale questo dato è stato pari al 12%. Diverse fonti e istituzioni internazionali raccomandano che i bambini in età scolare dormano almeno 9-10 ore al giorno.

<b>Ore di sonno dei bambini Ausl Modena -OKkio 2014</b>	
<b>Ore e minuti</b>	<b>%</b>
<9 ore	14
9 ore– 9 ore e 29	32,6
9 ore e 30minuti – 9 ore e 59	32,2
>= 10 ore	21,2

Nella nostra Ausl non si evidenzia alcuna correlazione fra ore di sonno e prevalenza di bambini sovrappeso-obesi.



## Per un confronto

	Valore aziendale 2008*	Valore aziendale 2010	Valore aziendale 2012	Valore aziendale 2014	Valore regionale 2014	Valore nazionale 2014
Prevalenza di bambini sotto-normopeso	65,3*	71,3%	71,0%	<b>66,8%</b>	71,4%	69,2%
§Prevalenza di bambini sovrappeso e obesi	34,7*	28,7%	29,0%	<b>33,0%</b>	28,6%	30,7%
Prevalenza di bambini sovrappeso	23,5*	19,8%	21,8%	<b>24,4%</b>	20,9%	20,9%
§Prevalenza di bambini obesi	11,2*	8,9%	7,2%	<b>8,6%</b>	7,7%	9,8%
Mediana di IMC		17,1	17,4	<b>17,3</b>	17,1	17,1

\* si specifica che nel 2008 il campionamento è stato fatto con rappresentatività regionale e non aziendale

§ Variabili per le quali è stato effettuato un confronto tra le rilevazioni svolte a livello regionale. La variazione statisticamente significativa ( $p < 0,05$ ) è indicata con \*\*

## Conclusioni

Rispetto al 2010 e al 2012, in questa terza rilevazione si è riscontrata una prevalenza di sovrappeso ed obesità nella nostra AUSL che sembra essere superiore rispetto ai valori regionali, ma tali differenze non risultano statisticamente significative.

Permane, quindi, il problema dell'eccesso di peso nella popolazione infantile anche nella nostra AUSL, essendo circa 1/3 dei bambini in questa condizione, collocandosi a livelli simili rispetto alla media nazionale.

I risultati del presente rapporto accrescono ulteriormente la reale e giustificata preoccupazione sul futuro stato di salute della nostra popolazione. Un'ampia letteratura scientifica conferma inconfutabilmente il rischio che il sovrappeso, e in misura sensibilmente maggiore l'obesità, già presenti in età pediatrica ed adolescenziale persistano in età adulta.


Per cogliere segni di cambiamento nell'andamento del fenomeno e per misurare gli effetti legati agli interventi di popolazione, comunque in corso da diversi anni, è necessario mantenere una sorveglianza continua del fenomeno nella nostra popolazione infantile. OKkio alla SALUTE rappresenta una risposta a questa esigenza.

## LE ABITUDINI ALIMENTARI DEI BAMBINI

Una dieta ad alto tenore di grassi e ad elevato contenuto calorico è associata ad aumento del peso corporeo che nel bambino tende a conservarsi fino all'età adulta. Una dieta qualitativamente equilibrata, in termini di bilancio fra grassi, proteine e glicidi, e la sua giusta distribuzione nell'arco della giornata, contribuisce a produrre e/o a mantenere un corretto stato nutrizionale.

### *I nostri bambini fanno una prima colazione adeguata?*


Esistono diversi studi scientifici che dimostrano l'associazione tra l'abitudine a non consumare la prima colazione e l'insorgenza di sovrappeso. Per semplicità, in accordo con quanto indicato dall'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), è stata considerata adeguata la prima colazione che fornisce un apporto sia di carboidrati che di proteine, per esempio: latte (proteine) e cereali (carboidrati), o succo di frutta (carboidrati) e yogurt (proteine).



- ◆ Nella nostra Ausl il 61,8 % dei bambini fa una colazione qualitativamente adeguata.
- ◆ Il 6,1% non fa colazione (più i bambini rispetto alle bambine, 7,2% versus 4,9%) e il 32,1% non la fa qualitativamente adeguata.
- ◆ La prevalenza del non fare colazione non risulta essere significativamente più alta nei bambini con madri il cui titolo di studio è più basso (elementare o media).

## ***I nostri bambini, durante la merenda di metà mattina, mangiano in maniera adeguata?***


Oggi giorno viene raccomandato che, se è stata assunta una colazione adeguata, venga consumata a metà mattina una merenda contenente circa 100 calorie, che corrispondono in pratica a uno yogurt o a un frutto o a un succo di frutta senza zuccheri aggiunti. Alcune scuole prevedono la distribuzione della merenda agli alunni; in tal caso, nell'analisi dei dati, la merenda è stata classificata come adeguata.




- ◆ Solamente nel 29,6 % delle classi è stata distribuita una merenda di metà mattina.
- ◆ Solo una parte di bambini (33,7%) consuma una merenda adeguata di metà mattina.
- ◆ La maggior parte dei bambini (63,4%) fa merenda, ma in modo inadeguato, mentre il 2,9 % non la fa per niente.
- ◆ Risulta che una merenda adeguata viene fatta più frequentemente dalle femmine che dai maschi, mentre è più alta la percentuale di bambini che non fanno merenda le cui madri hanno un basso titolo di studio (elementare/media). Tuttavia, in entrambi i casi, la differenza non è statisticamente significativa.

## Quante porzioni di frutta e verdura mangiano i nostri bambini al giorno?

Le linee guida sulla sana alimentazione prevedono l'assunzione di almeno cinque porzioni al giorno di frutta o verdura. Il consumo di frutta e verdura nell'arco della giornata garantisce un adeguato apporto di fibre e sali minerali e consente di limitare la quantità di calorie introdotte. A differenza della prima raccolta dati (2008-09), dal 2010 ad oggi il consumo di frutta e verdura è stato richiesto con due domande distinte, una per la frutta e una per la verdura.



- ◆ Nella nostra Ausl, i genitori riferiscono che solo il 37,2% dei bambini consuma la **frutta** almeno 2-3 volte al giorno mentre il 26,6% ne consuma quotidianamente una sola porzione.
- ◆ Il 36,2% dei bambini mangia frutta meno di una volta al giorno o mai nell'intera settimana.
- ◆ Il consumo settimanale di frutta risulta sembra maggiore nel sesso femminile, tuttavia le percentuali non sono statisticamente significative.
- ◆ Il consumo quotidiano di frutta pare aumentare con l'aumento del livello di istruzione della madre, anche se le percentuali non sono statisticamente significative.




- ◆ Nella nostra Ausl, i genitori riferiscono che il 25,5% dei bambini consuma **verdura** almeno 2-3 volte al giorno, mentre il 31,4% ne consuma quotidianamente una sola porzione.
- ◆ Il 43,1% dei bambini consuma verdura meno di una volta al giorno o mai nell'intera settimana.
- ◆ Risulta un maggior consumo di verdura da parte delle femmine rispetto i maschi (il 26,7% rispetto il 22,5% consuma 2-3 porzioni al giorno). Emerge inoltre che il consumo di verdura aumenta con l'aumento del titolo di studio della madre.\*

\*Differenza statisticamente significativa (P<0,01)


### ◆ **Quante bibite zuccherate e gassate al giorno consumano i nostri bambini?**

Mediamente in una lattina di bevanda zuccherata (33 cc) è contenuta una quantità di zuccheri aggiunti pari a 40-50 grammi, fra 5 e 8 cucchiaini, con l'apporto calorico che ne consegue. A differenza della prima raccolta dati (2008-09), il consumo di bevande zuccherate e bevande gassate dal 2010 ad oggi è stato indagato con due domande distinte, una per le bevande zuccherate e una per le bevande gassate.



- ◆ Nella nostra Ausl il 55,2% dei bambini consuma **bevande zuccherate** meno di una volta al giorno o mai
- ◆ Il 30,4% dei bambini assume bevande zuccherate una volta al giorno e il 14,4% più volte.
- ◆ Non vi è una differenza significativa nel consumo di bibite zuccherate tra femmine e maschi, mentre risulta che vi sia una riduzione nella frequenza di consumo con l'aumentare del titolo di studio della madre (Il 24,7% di bambini le cui madri hanno una licenza elementare/medie consumano bibite più volte al giorno rispetto il 7,6% di bambini le cui madri sono laureate).\*

\*Differenza statisticamente significativa (P=0.00)



- ◆ Nella nostra Ausl l'88,7% dei bambini consuma meno di una volta al giorno o mai delle **bevande gassate**.
- ◆ Il 6,8% dei bambini assume bevande gassate una volta al giorno mentre il 4,5% più volte.
- ◆ Non vi è differenza significativa di consumo fra maschi e femmine, mentre il consumo di bibite gassate almeno una volta al giorno decresce con l'aumento della scolarità della madre (dal 19% per licenza elementare/medie al 7% per laurea).\*

\*Differenza statisticamente significativa (P=0.00)

### ***L'igiene orale dei nostri bambini: quanti bambini si lavano i denti dopo cena?***

L'abitudine di lavarsi i denti è essenziale per la prevenzione della carie dentale e dell'igiene del cavo orale. Per indagare la frequenza di questa pratica tra i bambini, in quest'ultima raccolta dati e precisamente nel questionario rivolto a loro, è stata inserita una domanda specifica: "Ieri dopo cena ti sei lavato i denti?".

- ◆ L' 86,2% dei bambini della nostra Ausl ha dichiarato di essersi lavato i denti la sera precedente l'indagine. A livello nazionale questo dato è risultato pari all'82%.

## Per un confronto

Prevalenza di bambini che...	Valore desiderabile per i bambini	Valore aziendale 2010	Valore aziendale 2012	Valore aziendale 2014	Valore regionale 2014	Valore nazionale 2014
§ hanno assunto la colazione al mattino dell'indagine	100%	94,6%	95,0%	<b>93,9%</b>	94,4%	91,9%
§ hanno assunto una colazione adeguata il mattino dell'indagine	100%	62,9%	64,0%	<b>61,8%</b>	63,3%	60,6%
hanno assunto una merenda adeguata a metà mattina	100%	24,8%	24,8%	<b>33,7%</b>	55,7%	44,6%
assumono 5 porzioni di frutta e/o verdura giornaliera	100%	6,5%	6,7%	<b>9,4%</b>	11,6%	8,1%
assumono bibite zuccherate e/o gassate almeno una volta al giorno	0%	44,9%	48,3%	<b>46,9%</b>	38,84%	41,2%

§ Variabili per le quali è stato effettuato un confronto tra le rilevazioni svolte a livello regionale. La variazione statisticamente significativa ( $p < 0,05$ ) è indicata con \*\*

## Conclusioni

Nella nostra Ausl, con la quarta raccolta dei dati, si osservano leggeri cambiamenti rispetto al 2010 e 2012, in particolare è aumentata la percentuale di bambini che assumono una merenda adeguata a metà mattina e che consumano almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, contemporaneamente è lievemente diminuita la quantità di bambini che ingeriscono bevande zuccherate e/o gassate almeno una volta al giorno.

Tuttavia i valori riscontrati, peraltro al di sotto della media regionale, rimangono insoddisfacenti, quindi nell'ottica di migliorare ulteriormente le abitudini alimentari dei bambini e ridurre il rischio di sovrappeso ed obesità, è necessario implementare gli interventi prevedendo anche un forte supporto da parte della scuola ai bambini e alle loro famiglie.



## L'USO DEL TEMPO DEI BAMBINI: L'ATTIVITÀ FISICA

L'attività fisica è un fattore determinante per mantenere o migliorare la salute dell'individuo essendo in grado di ridurre il rischio di molte malattie cronico-degenerative. È universalmente accettato in ambito medico che un'adeguata attività fisica, associata ad una corretta alimentazione, possa prevenire il rischio di sovrappeso nei bambini. Si consiglia che i bambini facciano attività fisica moderata o intensa ogni giorno per almeno 1 ora. Questa attività non deve essere necessariamente continua ed include tutte le attività motorie quotidiane.

### Quanti bambini sono fisicamente non attivi?

La creazione delle condizioni che permettono ai bambini di essere attivi fisicamente dipende innanzitutto dalla comprensione di tale necessità da parte della famiglia e quindi da una buona collaborazione fra la scuola e la famiglia. Nel nostro studio, il bambino è considerato non attivo se non ha svolto almeno 1 ora di attività fisica il giorno precedente all'indagine (cioè, attività motoria a scuola e attività sportiva strutturata e ha giocato all'aperto nel pomeriggio). L'inattività fisica è stata studiata quindi non come abitudine, ma solo in termini di prevalenza puntuale riferita al giorno precedente all'indagine.

- ◆ Nel nostro studio il 9,7% dei bambini risulta non attivo il giorno antecedente all'indagine.
- ◆ Solo il 34,6% tuttavia ha partecipato ad un'attività motoria curricolare a scuola nel giorno precedente (questo può dipendere dal fatto che il giorno precedente poteva non essere quello in cui era prevista l'ora curricolare).
- ◆ Le femmine non attive (10,4%) sono in percentuale simile ai maschi (9,4%).
- ◆ Non si rilevano differenze statisticamente significative della percentuale di bambini non attivi in rapporto alle aree geografiche in cui essi vivono.


**Bambini fisicamente non attivi\* (%)**  
**Ausl di Modena - OKkio 2014**

<b>Caratteristiche</b>	<b>Non Attivi#</b>
<b>Sesso</b>	
maschi	9,4
femmine	10,4
<b>Zona abitativa</b>	
<10.000 abitanti	14,9
10.000-50.000	12,5
>50.000	5,5
metropolitana/perimetropolitana	--

\*Il giorno precedente non hanno svolto attività motoria a scuola e attività sportiva strutturata e non hanno giocato all'aperto nel pomeriggio

## ***I bambini giocano all'aperto e fanno attività sportiva strutturata?***


Il pomeriggio dopo la scuola costituisce un periodo della giornata eccellente per permettere ai bambini di fare attività fisica; è quindi molto importante sia il gioco all'aperto che lo sport strutturato. I bambini impegnati in queste attività tendono a trascorrere meno tempo in attività sedentarie (televisione e videogiochi) e quindi a essere meno esposti al sovrappeso/obesità.



- ◆ Il 76,2% del totale dei bambini ha giocato all'aperto il pomeriggio antecedente all'indagine.
- ◆ I maschi giocano all'aperto più delle femmine.
- ◆ Il 54,7% dei bambini ha fatto attività sportiva strutturata il pomeriggio antecedente all'indagine.
- ◆ I maschi sembrano fare sport più delle femmine, ma la differenza non è statisticamente significativa.

## **Secondo i genitori, durante la settimana quanti giorni i bambini fanno attività fisica per almeno un'ora?**


Per stimare l'attività fisica dei bambini si può ricorrere all'informazione fornita dai genitori, ai quali si è chiesto quanti giorni, in una settimana normale, i bambini giocano all'aperto o fanno sport strutturato per almeno un'ora al giorno (limite minimo raccomandato) al di fuori dell'orario scolastico.



- ◆ Secondo i loro genitori, nella nostra Ausl, circa 3 bambini su 10 (33,8%) fanno un'ora di attività fisica per 2 giorni la settimana, il 5,6% neanche un giorno e solo il 16,3% da 5 a 7 giorni.
- ◆ I maschi sembrano svolgere attività fisica più giorni delle femmine, ma la differenza non è statisticamente significativa.
- ◆ La zona di abitazione non è associata ad una diversa frequenza di attività fisica da parte dei bambini.

## Come si recano a scuola i bambini?

Un altro modo per rendere fisicamente attivi i bambini è far loro percorrere il tragitto casa-scuola a piedi o in bicicletta, compatibilmente con la distanza del loro domicilio dalla scuola.



- ♣ Il 26,1% dei bambini, nella mattina dell'indagine, ha riferito di essersi recato a scuola a piedi o in bicicletta; invece, il 73,9% ha utilizzato un mezzo di trasporto pubblico o privato.
- ♣ Non si rilevano differenze degne di nota per sesso e fra le diverse tipologie di zona abitativa.

## Per un confronto

Prevalenza di bambini che...	Valore desiderabile per i bambini	Valore aziendale 2010	Valore aziendale 2012	Valore aziendale 2014	Valore regionale 2014	Valore nazionale 2014
§ Bambini definiti fisicamente non attivi**	0%	15,8%	14,0%	<b>9,7%</b>	10,2%	15,6%
Bambini che hanno giocato all'aperto il pomeriggio prima dell'indagine	100%	75,1%	74,3%	<b>76,2%</b>	80,3%	68,4%
Bambini che hanno svolto attività sportiva strutturata il pomeriggio prima dell'indagine	100%	43,5%	47,5%	<b>54,7%</b>	48,0%	47,1%
Bambini che svolgono attività fisica almeno un'ora al giorno per 5-7 giorni alla settimana	100%	12,7%	16,8%	<b>16,3%</b>	17,6%	15,1%

§ Variabile per la quale è stato effettuato un confronto tra le rilevazioni svolte a livello regionale. La variazione statisticamente significativa ( $p < 0,05$ ) è indicata con \*\*

## **Conclusioni**

I dati raccolti hanno evidenziato che i bambini della nostra Ausl non fanno molta attività fisica. Si stima che 1 bambino su 10 sia fisicamente inattivo, pur in riduzione rispetto alle precedenti rilevazioni, senza differenze fra sessi. Appena poco più di 1 bambino su 6 ha un livello di attività fisica raccomandato per la sua età, anche per ragioni legate all'abitudine di recarsi a scuola con mezzi motorizzati, giocare poco all'aperto e non fare sufficienti attività sportive strutturate.

Sembra comunque di poter rilevare timidi segnali di miglioramento in relazione a quanto rilevato sia nell'indagine del 2010 che del 2012.

Anche in questo caso, le scuole e le famiglie devono collaborare nella realizzazione di condizioni e di iniziative che incrementino la naturale predisposizione dei bambini all'attività fisica.


## L'USO DEL TEMPO DEI BAMBINI: LE ATTIVITÀ SEDENTARIE

La crescente disponibilità di televisori e videogiochi, insieme con i profondi cambiamenti nella composizione e nella cultura della famiglia, ha contribuito ad aumentare il numero di ore trascorse in attività sedentarie. Pur costituendo un'opportunità di divertimento e talvolta di sviluppo del bambino, il momento della televisione si associa spesso all'assunzione di cibi fuori pasto che può contribuire al sovrappeso/obesità del bambino. Evidenze scientifiche mostrano che la diminuzione del tempo di esposizione alla televisione da parte dei bambini è associata ad una riduzione del rischio di sovrappeso e dell'obesità a causa prevalentemente del mancato introito di calorie legati ai cibi assunti durante tali momenti.

### **Quante ore al giorno i bambini guardano la televisione o usano i videogiochi?**

Diverse fonti autorevoli raccomandano un limite di esposizione complessivo alla televisione/ videogiochi per i bambini di età maggiore ai 2 anni di non oltre le 2 ore quotidiane, mentre è decisamente sconsigliata la televisione nella camera da letto dei bambini.

I seguenti dati mostrano la somma del numero di ore che i bambini trascorrono a guardare la TV e/o a giocare con i videogiochi-computer in un normale giorno di scuola, secondo quanto dichiarato dai genitori. Questi dati possono essere sottostimati nella misura in cui la discontinua presenza parentale non permetta di verificare la durata effettiva del tempo trascorso dai bambini nelle diverse attività.



- ◆ Nella nostra Ausl, i genitori riferiscono che il 66,2% dei bambini guarda la TV o usa videogiochi da 0 a due 2 ore al giorno, mentre il 27,8% è esposto quotidianamente alla TV o ai videogiochi per 3 a 4 ore e il 5,9% per almeno 5 ore.
- ◆ L'esposizione a più di 2 ore di TV o videogiochi è più frequente tra i maschi (40,5% versus 24,8%)\* e diminuisce con l'aumento del livello di istruzione della madre\*.
- ◆ Complessivamente il 35,1% dei bambini ha un televisore nella propria camera.
- ◆ L'esposizione a più di 2 ore di TV al giorno è più alta tra i bambini che hanno una TV in camera rispetto a chi non l'ha (19,9% versus 14,4%), ma la differenza non è statisticamente significativa.
- ◆ Considerando separatamente il tempo eccedente le 2 ore trascorso guardando la TV e quello superiore alle 2 ore impiegato giocando con i videogiochi, le prevalenze riscontrate sono: > 2 ore TV (16,3%); > 2 ore Videogiochi (2%).

\*Differenza statisticamente significativa ( $p < 0,01$ )

## **Complessivamente, quanto spesso i bambini guardano la televisione o giocano con i videogiochi durante il giorno?**

La televisione e i videogiochi rappresentano una parte importante dell'uso del tempo e delle attività sedentarie nella quotidianità dei bambini. Generalmente si ritiene che vi sia un rapporto fra le attività sedentarie e la tendenza verso il sovrappeso/obesità, per cui si raccomanda di controllare e limitare, quando necessario, la quantità di tempo che i bambini trascorrono davanti alla televisione o ai videogiochi.

- ◆ Nella nostra Ausl il 41,6% dei bambini ha guardato la TV la mattina prima di andare a scuola.
- ◆ Il 75,6% dei bambini ha guardato la televisione o ha utilizzato videogiochi il pomeriggio del giorno precedente e il 76,8% la sera.
- ◆ Solo il 6,9% dei bambini non ha guardato la TV o utilizzato i videogiochi nelle 24 ore antecedenti l'indagine, mentre il 21,9% lo ha fatto in un periodo della giornata, il 40,8% in due periodi e il 30,3% ne ha fatto uso durante la mattina il pomeriggio e la sera.
- ◆ L'esposizione a tre momenti di utilizzo di TV e/o videogiochi è più frequente tra i maschi rispetto alle femmine (36,8% versus 23,2%)\*e diminuisce con l'aumento del livello di istruzione della madre\*.

\*Differenza statisticamente significativa ( $p < 0,01$ )

### **Per un confronto**

	<b>Valore desiderabile per i bambini</b>	<b>Valore aziendale 2010</b>	<b>Valore aziendale 2012</b>	<b>Valore aziendale 2014</b>	<b>Valore regionale 2014</b>	<b>Valore nazionale 2014</b>
Bambini che trascorrono al televisore o ai videogiochi più di 2 ore al giorno	0%	32,8%	32,1%	<b>33,1%</b>	30,5%	34,5%
Bambini con televisore in camera	0%	36,6%	38,6%	<b>35,1%</b>	31,5%	41,7%

## **Conclusioni**

Nella nostra Ausl sono molto diffuse, tra i bambini, le attività sedentarie, come il trascorrere molto tempo a guardare la televisione e giocare con i videogiochi.

Rispetto alle raccomandazioni, molti bambini eccedono ampiamente nell'uso della TV e dei videogiochi, in particolare nel pomeriggio, quando potrebbero dedicarsi ad altre attività più salutari, come i giochi di movimento o lo sport o attività relazionali con i coetanei. Queste attività sedentarie sono sicuramente favorite dal fatto che 1/3 dei bambini dispone di un televisore in camera propria. Tutti questi fattori fanno sì che solo 7 bambini su 10 di fatto ottemperino alle raccomandazioni sul tempo da dedicare alla televisione o ai videogiochi (meno di 2 ore al giorno di TV o videogiochi).


Rispetto al 2010 e al 2012 non si evidenziano cambiamenti degni di nota nella quantità di tempo trascorso davanti al televisore e ai videogiochi, mentre, si registra rispetto al 2012 un, seppur lieve, calo nei bambini con la TV in camera.

## LA PERCEZIONE DELLE MADRI SULLA SITUAZIONE NUTRIZIONALE E SULL'ATTIVITÀ FISICA DEI BAMBINI

Un primo passo verso il cambiamento è costituito dall'acquisizione della coscienza di un problema. In realtà, la cognizione che comportamenti alimentari inadeguati e stili di vita sedentari siano causa del sovrappeso/obesità tarda a diffondersi nella collettività. A questo fenomeno si aggiunge la mancanza di consapevolezza da parte dei genitori dello stato di sovrappeso/obesità del proprio figlio e del fatto che il bambino mangi troppo o si muova poco. Di fronte a tale situazione, la probabilità di riuscita di misure preventive risulta limitata.

### **Qual è la percezione della madre rispetto allo stato ponderale del proprio figlio?**

Alcuni studi hanno dimostrato che i genitori possono non avere un quadro corretto dello stato ponderale del proprio figlio. Questo fenomeno è particolarmente importante nei bambini sovrappeso/obesi che vengono al contrario percepiti come normopeso.




- ◆ Nella nostra Ausl ben il 48,2% delle madri di bambini sovrappeso e l' 8,8% delle madri di bambini obesi ritiene che il proprio bambino sia normopeso.
- ◆ Nelle famiglie con bambini in sovrappeso la percezione cambia in rapporto al sesso del bambino: le mamme con figlie femmine tendono a sottostimare maggiormente lo stato ponderale. La situazione si presenta opposta nelle famiglie di bambini obesi tuttavia, in entrambi i casi, la differenza non è statisticamente significativa.
- ◆ Sia per i bambini sovrappeso che obesi, la percezione pare essere più accurata tra le madri che hanno un livello di istruzione di scuola superiore, anche se la differenza non è statisticamente significativa.



## Qual è la percezione della madre rispetto alla quantità di cibo assunta dal proprio figlio?

La percezione della quantità di cibo assunto dai propri figli può anche influenzare la probabilità di operare cambiamenti positivi. Anche se vi sono molti altri fattori determinanti di sovrappeso e obesità, l'eccessiva assunzione di cibo può contribuire al problema.




- ◆ L'81,1% delle mamme di bambini sovrappeso e il 50% di bambini obesi ritiene che il proprio figlio mangi la giusta quantità di cibo, mentre il 17,1% delle madri di bambini sovrappeso e il 50% di bambini obesi ritiene che il proprio bambino mangi troppo.\*
- ◆ Considerando il sesso dei bambini in sovrappeso e obesi sembra che l'82,8% delle mamme con figlie femmine ritenga che il consumo di cibo giornaliero sia adeguato, rispetto al 66,3% di mamme con figli maschi. Viceversa il 17,2% di mamme con figlie femmine pensa che il consumo di cibo sia eccessivo rispetto al 31,3% di mamme con figli maschi.
- ◆ Per quanto riguarda il titolo di studio della madre, pare che la percezione di un consumo eccessivo di cibo, tra i bambini sovrappeso obesi, aumenti con l'aumentare della scolarità materna. Sia nel caso della percezione riferita al sesso, che in relazione al titolo di studio, le differenze non risultano essere statisticamente significative.

\*Differenza statisticamente significativa ( $p < 0,01$ )

## Qual è la percezione della madre rispetto all'attività fisica svolta dal figlio?

Sebbene molti genitori incoraggino i loro figli ad impegnarsi in attività fisica e nello sport organizzato, alcuni possono non essere a conoscenza delle raccomandazioni che i bambini facciano almeno un'ora di attività fisica ogni giorno. Anche se l'attività fisica è difficile da misurare, un genitore che ritenga che il proprio bambino sia attivo, mentre in realtà non si impegna in nessuno sport o gioco all'aperto e non ha partecipato a un'attività motoria scolastica nel giorno precedente, ha quasi certamente una percezione sbagliata del livello di attività fisica del proprio figlio.



- ◆ All'interno del gruppo di bambini non attivi, il 61,9% delle madri ritiene che il proprio figlio svolga sufficiente attività fisica e il 9,5% che ne svolga tanta.
- ◆ Limitatamente ai non attivi non è stata constatata nessuna differenza statisticamente significativa per sesso dei bambini.
- ◆ In relazione al titolo di studio della madre risulterebbe che la percezione di una scarsa attività fisica tra i bambini non attivi avvenga maggiormente da parte delle mamme con diploma di scuola superiore (33,3% contro il 29,4% delle mamme con licenza elementare/media e il 16,7% di quelle con laurea).

## Per un confronto

Madri che percepiscono...	Valore desiderabile	Valore aziendale 2010	Valore aziendale 2012	Valore aziendale 2014	Valore regionale 2014	Valore nazionale 2014
§ in modo adeguato* lo stato ponderale del proprio figlio, quando questo è sovrappeso	100%	50%	51,3%	<b>50,9%</b>	55,1%	50,5%
in modo adeguato* lo stato ponderale del proprio figlio, quando questo è obeso	100%	97%	91,7%	<b>91,2%</b>	91,4%	86,3%
l'assunzione di cibo del proprio figlio come "poco o giusto", quando questo è sovrappeso o obeso	Da ridurre	67,7%	70,6%	<b>75,2%</b>	66,3%	77,7%
l'attività fisica del proprio figlio come scarsa, quando questo risulta inattivo	Da aumentare	30,9%	37,5%	<b>28,6%</b>	31,3%	41,3%

\* Adeguato = un po' in sovrappeso/molto in sovrappeso

§ Variabile per la quale è stato effettuato un confronto tra le rilevazioni svolte a livello regionale. La variazione statisticamente significativa ( $p < 0,05$ ) è indicata con \*\*

## Conclusioni

Nella nostra Ausl, la percezione dello stato ponderale dei figli è corretta per il 50% delle madri con bambini in sovrappeso e per il 91% di mamme con figli obesi. Esiste pertanto una notevole sottostima del problema. Inoltre, molti genitori, in particolare di bambini sovrappeso/obesi, sembrano non valutare correttamente la quantità di cibo assunta dai propri figli.

La situazione è simile circa la percezione delle madri sul livello di attività fisica dei propri figli: il 71,4% dei genitori con figli non attivi ritiene che il proprio bambino faccia sufficiente o troppa attività fisica e solo 1 genitore su 3 ha una percezione che sembra coincidere con la situazione reale.

Rispetto al 2010 e al 2012 la percezione delle madri rispetto allo stato ponderale dei figli risulta essere sostanzialmente invariata, mentre quella rispetto alla quantità di cibo assunta in rapporto allo stato nutrizionale sembrerebbe peggiorata, come anche la percezione riguardo l'attività fisica effettivamente svolta.

Solamente sensibilizzando i genitori e aiutandoli a riconoscere e correttamente valutare le reali abitudini dei propri figli si potranno raggiungere più facilmente i cambiamenti auspicati.

## L'AMBIENTE SCOLASTICO E IL SUO RUOLO NELLA PROMOZIONE DI UNA SANA ALIMENTAZIONE E DELL'ATTIVITÀ FISICA

E' dimostrato che la scuola può giocare un ruolo fondamentale nel migliorare lo stato ponderale dei bambini, sia creando condizioni favorevoli per una corretta alimentazione e per lo svolgimento dell'attività motoria strutturata, che promuovendo, attraverso l'educazione, abitudini alimentari adeguate.


La scuola rappresenta, inoltre, l'ambiente ideale per seguire nel tempo l'evoluzione dello stato ponderale dei bambini e per creare occasioni di comunicazione con le famiglie che determinino un loro maggior coinvolgimento nelle iniziative di promozione di una sana alimentazione e dell'attività fisica dei bambini.

### La partecipazione della scuola all'alimentazione dei bambini

#### *Quante scuole sono dotate di mensa e quali sono le loro modalità di funzionamento?*

Quando gestite secondo criteri nutrizionali basati sulle evidenze scientifiche e se frequentate dalla maggior parte degli alunni, le mense possono avere una ricaduta diretta nell'offrire ai bambini dei pasti qualitativamente e quantitativamente equilibrati che favoriscono un'alimentazione adeguata e contribuiscono alla prevenzione del sovrappeso/obesità.

- ◆ Nella nostra Ausl l'81,8% delle scuole campionate, ha una mensa scolastica funzionante.
- ◆ Nelle scuole dotate di una mensa, il 77,8% di esse sono aperte almeno 5 giorni la settimana.
- ◆ La mensa viene utilizzata mediamente dal 64,4% dei bambini.




- ◆ La definizione del menù scolastico è più frequentemente stabilita da un'azienda appaltatrice, seguito da un dietista esterno.
- ◆ Secondo il giudizio dei dirigenti scolastici l'88,2% delle mense risulta essere adeguato per i bisogni dei bambini.

## ***È prevista la distribuzione di alimenti all'interno della scuola?***

Negli ultimi anni sempre più scuole hanno avviato distribuzioni di alimenti allo scopo di integrare e migliorare l'alimentazione degli alunni. In alcune di queste esperienze viene associato anche l'obiettivo dimostrativo ed educativo degli alunni.

- ◆ Nella nostra Ausl, le scuole che distribuiscono ai bambini frutta o latte o yogurt, nel corso della giornata, sono il 70%.
- ◆ In tali scuole, la distribuzione si effettua esclusivamente a metà mattina (100%).
- ◆ Durante l'anno scolastico il 70,4% delle classi ha partecipato ad attività di promozione del consumo di alimenti sani all'interno della scuola con Enti e/o associazioni.



- ◆ In questo anno scolastico il 63% delle classi ha partecipato alla distribuzione di frutta, verdura o yogurt come spuntino.
- ◆ Il 14,8% delle classi ha ricevuto materiale informativo.
- ◆ il 29,6% delle classi ha organizzato incontri con esperti esterni alla scuola.

## ***Sono segnalati dei distributori automatici?***

Lo sviluppo di sovrappeso e obesità nei bimbi può essere favorito dalla presenza nelle scuole di distributori automatici di merendine o bevande zuccherate di libero accesso agli alunni.


- ◆ I distributori automatici di alimenti sono presenti nel 59,1% delle scuole; il 16,6% è accessibile sia agli adulti che ai bambini.
- ◆ All'interno del gruppo di scuole con distributori automatici, solo il 46,2% mette a disposizione succhi di frutta, frutta fresca, o yogurt.

## La partecipazione della scuola all'attività motoria dei bambini

### **Quante scuole riescono a far fare ai propri alunni 2 ore di attività motoria e quali sono gli ostacoli osservati?**

Nelle "Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" del MIUR, pubblicate nel Settembre 2012, si sottolinea l'importanza dell'attività motoria e sportiva per il benessere fisico e psichico del bambino.

Nel questionario destinato alla scuola viene chiesto se gli alunni svolgono 2 ore di attività motoria all'interno dell'orario scolastico.




- ◆ La maggioranza delle scuole (52,4%) dichiara che tutte le classi svolgono normalmente 2 ore di attività motoria, sebbene il 38,1% riferisce che circa la metà (14,3%) o poche (23,8%) classi le fanno.
- ◆ Le ragioni principalmente addotte a spiegazione del mancato svolgimento dell'attività motoria nella scuola includono: struttura dell'orario scolastico (63,6%), mancanza di una palestra (27,3%), eccessiva distanza della palestra dalla scuola (9,1%) e scelta del docente (9,1%).

### ***Le scuole offrono opportunità di praticare attività motoria oltre quella curricolare all'interno della struttura scolastica?***

L'opportunità offerta dalla scuola ai propri alunni di fare attività motoria extra-curricolare (cioè quella offerta dalla scuola) potrebbe avere un effetto benefico, oltre che sulla salute dei bambini, anche sulla loro abitudine a privilegiare l'attività motoria.

- ◆ Le scuole che offrono agli alunni la possibilità di effettuare all'interno della scuola occasioni di attività motoria sono il 45,5%.




- ◆ Laddove offerta, l'attività motoria viene svolta esclusivamente durante il pomeriggio e in ricreazione.
- ◆ Queste attività si svolgono più frequentemente nel giardino (70%), in palestra (20%), in piscina (20%) o in aula (20%).

## Il miglioramento delle attività curricolari a favore dell'alimentazione e dell'attività motoria dei bambini

### Quante scuole prevedono nel loro curriculum la formazione sui temi della nutrizione?

In molte scuole del Paese sono in atto iniziative di miglioramento del curriculum formativo scolastico a favore della sana alimentazione dei bambini

- ▲ L'attività curricolare nutrizionale è prevista dal 91% delle scuole campionate nella nostra Ausl.




- ▲ In tali scuole, la figura più frequentemente coinvolta è l'insegnante di classe. Molto meno comune è il coinvolgimento diretto di altri insegnanti o della AUSL.



## **Quante scuole prevedono il rafforzamento del curriculum formativo sull'attività motoria?**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha avviato iniziative per il miglioramento della qualità dell'attività motoria svolta nelle scuole primarie; è interessante capire in che misura la scuola è riuscita a recepire tale iniziativa.

- ◆ Nel nostro campione, il 95,5% delle scuole ha cominciato a realizzare almeno un'attività.



- ◆ In tali attività, viene frequentemente coinvolto un esperto esterno; nel 66,7 % dei casi è stata effettuata la valutazione delle abilità motorie dei bambini, nel 19% lo sviluppo di un curriculum strutturato e nel 14,3% la formazione degli insegnanti.


## Le attività di promozione dell'alimentazione e dell'attività fisica dei bambini

### ***Nella scuola sono attive iniziative finalizzate alla promozione di stili di vita salutari realizzate in collaborazione con Enti o Associazioni?***


Nella scuola sono in atto numerose iniziative finalizzate a promuovere sane abitudini alimentari e attività motoria in collaborazione con enti, istituzioni e AUSL.

- ◆ I Servizi Sanitari della AUSL costituiscono un partner privilegiato e sono coinvolti nella realizzazione di programmi di educazione nutrizionale nel 22,7% delle scuole e nella promozione dell'attività fisica nel 9,1% delle scuole.

◆



- ◆ Tale collaborazione si realizza più frequentemente attraverso l'insegnamento diretto agli alunni, l'appoggio tecnico agli insegnanti e la sorveglianza.




- ◆ Oltre la AUSL, gli enti e le associazioni che hanno prevalentemente organizzato iniziative di promozione alimentare nelle scuole sono le Associazioni di agricoltori ed il Comune.


## Risorse a disposizione della scuola

### *Nella scuola o nelle sue vicinanze sono presenti strutture utilizzabili dagli alunni?*

Per poter svolgere un ruolo nella promozione della salute dei bambini, la scuola necessita di risorse adeguate nel proprio plesso e nel territorio.



- ◆ Secondo i dirigenti scolastici, il 90,9% delle scuole possiede delle aule adeguate, l'86,4% dei servizi igienici adeguati e l'86,4% ha le attrezzature per disabili.
- ◆ Sono relativamente meno adeguate la palestra (68,2%) e la mensa scolastica (61,4%).



- ◆ Il 90,9% delle scuole ha la palestra nelle vicinanze o all'interno della propria struttura.
- ◆ Sono presenti nel plesso o nelle vicinanze dell'edificio scolastico spazi aperti (95,2%), campi da calcio (95,5%), parchi gioco (90,9%), piste ciclabili (80%) ed aree verdi (81%).
- ◆ Risultano invece meno presenti le piscine (54,5%) e i campi polivalenti (71,4%).

## La scuola e il divieto di fumo negli spazi aperti

La legge n°128 del Dicembre 2013, che disciplina la "*Tutela della salute nelle scuole*", estende il divieto di fumo nelle scuole anche nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni. Pertanto le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, dovranno adeguarsi a quanto legiferato.

Al fine di indagare la facilità con la quale i dirigenti scolastici, o loro delegati, riescano a far rispettare quanto previsto dalla legge, nel questionario scuola di OKkio alla SALUTE è stata inserita nel 2014 una domanda specifica.

- ◆ Nella nostra Ausl, il 63,6% dei dirigenti scolastici dichiara di non aver avuto "mai" difficoltà nell'applicare la legge sul divieto di fumo negli spazi aperti della scuola (rispetto al 76,1% a livello nazionale); per contro il 4,5% degli stessi dichiara di aver incontrato difficoltà "sempre".

## Coinvolgimento delle famiglie


### *In quante scuole si constata un coinvolgimento attivo dei genitori nelle iniziative di promozione di stili di vita sani?*

Le iniziative rivolte alla promozione di una sana abitudine alimentare nei bambini vedono il coinvolgimento attivo della famiglia nel 50% delle scuole campionate nello studio e quelle rivolte alla promozione dell'attività motoria nel 27,3%.

#### Per un confronto

Nel grafico di seguito sono riportati i confronti con i dati regionali e nazionali del 2014. Dato il numero esiguo delle scuole campionate a livello aziendale, e di conseguenza intervalli di confidenza generalmente più ampi, è necessaria la massima cautela nell'interpretare e commentare i confronti.

### Il "barometro": pochi indicatori per una sintesi a colpo d'occhio dei progressi nella scuola



## Conclusioni

La letteratura indica che gli interventi di prevenzione, per essere efficaci, devono prevedere il coinvolgimento della scuola e della famiglia, che rappresentano le principali "agenzie educative" a favore del bambino, attraverso programmi integrati, che coinvolgano cioè diversi settori e ambiti sociali, e multi-componenti, che mirino ad aspetti diversi della salute del bambino, quali alimentazione, attività fisica, prevenzione di fattori di rischio legati all'età, con l'obiettivo generale di promuovere l'adozione di stili di vita più sani.

Le caratteristiche degli ambienti scolastici, soprattutto sotto il profilo delle condizioni favorevoli o meno la sana alimentazione ed il movimento, sono generalmente poco conosciute. I dati raccolti con OKkio alla SALUTE hanno permesso di saperne di più colmando questa lacuna e di mettere le basi per un monitoraggio nel tempo del miglioramento di quelle condizioni che devono permettere alla scuola di svolgere il ruolo di promozione della salute dei bambini e delle loro famiglie. Rispetto ai valori regionali e nazionali, si evidenzia principalmente la necessità di aumentare il coinvolgimento dei genitori sia sul tema alimentazione sia per quanto riguarda l'attività fisica e favorire l'attività motoria extracurricolare. Si evidenzia invece nelle scuole primarie della provincia di Modena, una particolare attenzione all'educazione alimentare curricolare ed all'attività motoria extracurricolare.

## CONCLUSIONI GENERALI

---

OKkio alla SALUTE ha permesso di raccogliere informazioni rappresentative in tempi brevi e a costi limitati, creando, inoltre, un'efficiente rete di collaborazione fra gli operatori del mondo della scuola e della salute.

È importante che la cooperazione avviata tra salute e scuola perduri nel tempo così da assicurare la continuazione negli anni del sistema di sorveglianza e il monitoraggio del fenomeno in studio. La letteratura scientifica, infatti, mostra sempre più chiaramente che gli interventi coronati da successo sono quelli integrati (con la partecipazione di famiglie, scuole, operatori della salute e comunità) e multicomponenti (che promuovono per esempio non solo la sana alimentazione ma anche l'attività fisica e la diminuzione della sedentarietà, la formazione dei genitori, il *counselling* comportamentale e l'educazione nutrizionale) e che hanno durata pluriennale.

È essenziale quindi programmare azioni di sanità pubblica in modo coordinato e condiviso tra enti, istituzioni e realtà locali per cercare di promuovere il consumo giornaliero di frutta e verdura così come la pratica dell'attività fisica tra i bambini. A questo proposito, la scuola potrebbe contribuire in modo determinante distribuendo una merenda bilanciata a metà mattina e facendo svolgere almeno due ore di attività motoria settimanale a tutti gli alunni. Molte iniziative sul primo di questi temi si sono sviluppate in questi anni, sia attraverso progetti autonomi nelle scuole che grazie ad alcuni programmi ministeriali finalizzati alla distribuzione gratuita di frutta per lo spuntino del mattino. Ugualmente importante è rendere l'ambiente urbano "a misura di bambino" aumentando i parchi pubblici, le aree pedonali e le piste ciclabili così da incentivare il movimento all'aria aperta.

L'attività di promozione di sani stili di vita a scuola è sviluppata da molti anni nella nostra provincia, ed in continua implementazione e miglioramento metodologico. A partire dal 2009-2010, anche il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Istituto Superiore di Sanità e le Regioni hanno infatti elaborato e distribuito in ogni Regione alcuni materiali di comunicazione e informazione rivolti a specifici target: bambini, genitori, insegnanti e scuole che hanno partecipato a OKkio alla SALUTE. Lo scopo di tale iniziativa è duplice: far conoscere le dimensioni del fenomeno obesità tra le nuove generazioni e fornire suggerimenti per scelte di stili di vita salutari.

Sono stati elaborati e distribuiti anche dei poster per gli ambulatori pediatrici realizzati in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria e con la Federazione Italiana dei Medici Pediatri. Tutti i materiali sono stati, a suo tempo, elaborati nell'ambito di OKkio alla SALUTE in collaborazione con il progetto "PinC - Programma nazionale di informazione e comunicazione a sostegno degli obiettivi di Guadagnare Salute", coordinato sempre dal CNESPS dell'Istituto Superiore di Sanità([http://www.epicentro.iss.it/focus/guadagnare\\_salute/PinC.asp](http://www.epicentro.iss.it/focus/guadagnare_salute/PinC.asp)).

I dati della quarta raccolta dati di OKkio alla SALUTE, presentati in questo rapporto, mostrano nella nostra Ausl la persistenza di un alto livello di sovrappeso/obesità ed il mantenimento di cattive abitudini alimentari oltre che di comportamenti contrari allo svolgimento di l'attività fisica e favorenti attività sedentarie. Qualche piccolo miglioramento relativamente a questi parametri è comunque rilevabile. Certamente, lo sviluppo di attività integrate all'interno di una strategia unitaria e di lungo periodo, come definita nel piano Regionale della prevenzione 2015-2018, potrà auspicabilmente contribuire al raggiungimento in futuro di ulteriori risultati positivi.

Per cercare di migliorare la situazione si suggeriscono alcune raccomandazioni dirette ai diversi gruppi di interesse:

### **Operatori sanitari**

Le dimensioni del fenomeno sovrappeso/obesità giustificano da parte degli operatori sanitari un'attenzione costante e regolare nei prossimi anni che dovrà esprimersi nella raccolta dei dati, nell'interpretazione delle tendenze, nella comunicazione ampia ed efficace dei risultati a tutti i gruppi di interesse e nella proposta/attivazione di interventi integrati tra le figure professionali appartenenti a istituzioni diverse allo scopo di stimolare o rafforzare la propria azione di prevenzione e di promozione della salute.

In particolare la collaborazione tra mondo della scuola e della salute potrà essere rafforzata attraverso interventi di educazione sanitaria focalizzati sui fattori di rischio modificabili, quali la

diffusione della conoscenza sulle caratteristiche della colazione e merende adeguate, il tempo eccessivo passato in attività sedentarie o alla televisione, che non dovrebbe superare le 2 ore al giorno. Inoltre, considerata la scarsa percezione dei genitori dello stato ponderale dei propri figli, gli interventi sanitari proposti dovranno includere anche interventi che prevedano una componente diretta al *counselling* e all'*empowerment* (promozione della riflessione sui vissuti e sviluppo di consapevolezza e competenze per scelte autonome) dei genitori stessi.

### **Operatori scolastici**

Gli studi mostrano in maniera incontrovertibile un ruolo chiave della scuola per affrontare efficacemente il problema della promozione della salute e dell'attività fisica dei bambini.

Seguendo la sua missione, la scuola dovrebbe estendere e migliorare le attività di educazione nutrizionale dei bambini, già oggi oggetto di intervento da parte di alcune scuole.

Per essere efficace tale educazione deve focalizzarsi, da una parte sulla valorizzazione del ruolo attivo del bambino, della sua responsabilità personale e sul potenziamento delle *life skills*, dall'altra, sull'acquisizione di conoscenze e del rapporto fra nutrizione e salute individuale, sulla preparazione, conservazione e stoccaggio degli alimenti.

Seppure implichi maggiori difficoltà, all'interno della scuola deve essere incoraggiata la distribuzione di almeno un pasto bilanciato al giorno che costituisce per il bambino una duplice opportunità: nutrirsi meglio e imparare a gustare il cibo mangiando anche nuovi alimenti.

In maniera più diretta gli insegnanti possono incoraggiare i bambini ad assumere abitudini alimentari più adeguate, promuovendo la colazione del mattino che migliora la performance e diminuisce il rischio di fare merende eccessive a metà mattina. A tal proposito i materiali di comunicazione, realizzati attraverso la collaborazione tra mondo della scuola e della salute, possono offrire agli insegnanti spunti e indicazioni per coinvolgere attivamente i bambini (<http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=278>).

La scuola può anche ridurre la distribuzione di bevande zuccherate e incentivare il consumo di frutta e yogurt.

Sul fronte dell'attività fisica, è necessario che le scuole assicurino almeno 2 ore di attività motoria e che cerchino di favorire le raccomandazioni internazionali di un'ora al giorno di attività fisica per i bambini.

### **Genitori**

I genitori dovrebbero essere coinvolti attivamente nelle attività di promozione di sani stili di vita.

L'obiettivo è sia favorire l'acquisizione di conoscenze sui fattori di rischio che possono ostacolare la crescita armonica del proprio figlio, come un'eccessiva sedentarietà, la troppa televisione, la poca attività fisica o alcune abitudini alimentari scorrette (non fare la colazione, mangiare poca frutta e verdura, eccedere con le calorie durante la merenda di metà mattina), sia favorire lo sviluppo di processi motivazionali e di consapevolezza che, modificando la percezione, possano facilitare l'identificazione del reale stato ponderale del proprio figlio.

I genitori dovrebbero, inoltre, riconoscere e sostenere la scuola, in quanto "luogo" privilegiato e vitale per la crescita e lo sviluppo del bambino e collaborare, per tutte le iniziative miranti a promuovere la migliore alimentazione dei propri figli, quale la distribuzione di alimenti sani e l'educazione alimentare. La condivisione, tra insegnanti e genitori, delle attività realizzate in classe può contribuire a sostenere "in famiglia" le iniziative avviate a scuola, aiutando i bambini a mantenere uno stile di vita equilibrato nell'arco dell'intera giornata.

Infine, laddove possibile, i genitori dovrebbero incoraggiare il proprio bambino a raggiungere la scuola a piedi o in bicicletta, per tutto o una parte del tragitto.

### **Leaders, decisori locali e collettività**

Le iniziative promosse dagli operatori sanitari, dalla scuola e dalle famiglie possono essere realizzate con successo solo se la comunità supporta e promuove migliori condizioni di alimentazione e di attività fisica nella popolazione. Per questo la partecipazione e la collaborazione dei diversi Ministeri, di Istituzioni e organizzazioni pubbliche e private, nonché dell'intera società, rappresenta una condizione fondamentale affinché la possibilità di scelte di vita salutari non sia confinata alla responsabilità della singola persona o della singola famiglia, ma piuttosto sia sostenuta da una responsabilità collettiva.



## MATERIALI BIBLIOGRAFICI

---

### Politica e strategia di salute

- Brennan LK, Brownson RC, Orleans CT. Childhood obesity policy research and practice: evidence for policy and environmental strategies. *Am J Prev Med.* 2014;46(1):e1-16.
- EU Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020; disponibile all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/health/nutrition\\_physical\\_activity/docs/childhoodobesity\\_actionplan\\_2014\\_2020\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf) (ultima consultazione novembre 2014).
- Hendriks AM, Kremers SP, Gubbels JS, Raat H, de Vries NK, Jansen MW. Towards health in all policies for childhood obesity prevention. *J Obes.* 2013;2013.
- World Health Organization. Population-based approaches to childhood obesity prevention. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. Geneva: WHO, 2012.
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, settembre 2012 ; disponibile all'indirizzo: [http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8afacbd3-04e7-4a65-9d75-cec3a38ec1aa/prot7734\\_12\\_all2.pdf](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8afacbd3-04e7-4a65-9d75-cec3a38ec1aa/prot7734_12_all2.pdf) (ultima consultazione novembre 2014).
- ArancetaBartrina J. Public health and the prevention of obesity: failure or success? *Nutr Hosp.* 2013;28 Suppl 5:128-37. Foltz JL, May AL, Belay B, Nihiser AJ, Dooyema CA, Blanck HM. Population-level intervention strategies and examples for obesity prevention in children. *AnnuRevNutr.* 2012;32:391-415.
- Wu Y, Lau BD, Bleich S, Cheskin L, Boult C, Segal JB, Wang Y. Future Research Needs for Childhood Obesity Prevention Programs: Identification of Future Research Needs From Comparative Effectiveness Review No. 115.
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana, ottobre 2011; disponibile all'indirizzo: <http://www.governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=65210> (ultima consultazione novembre 2014).
- Gortmaker SL, Swinburn BA, Levy D, Carter R, Mabry PL, Finegood DT, Huang T, Marsh T, Moodie ML. Changing the future of obesity: science, policy, and action. *Lancet* 2011; 378:838-47.
- Ministero della Salute. Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, 2010; disponibile all'indirizzo: [http://www.salute.gov.it/imgs/c\\_17\\_pubblicazioni\\_1248\\_allegato.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_pubblicazioni_1248_allegato.pdf) (ultima consultazione novembre 2014).
- Branca F, Nikogosian H, Lobstein T. La sfida dell'obesità nella Regione europea dell'OMS e le strategie di risposta. Compendio. Geneva: WHO; 2007. Traduzione italiana curata dal Ministero della Salute e dalla Società Italiana di Nutrizione Umana, stampata nel 2008. <http://www.sinu.it/documenti/OMS%20La%20Sfida%20dell'Obesit%C3%A0%20e%20le%20Strategie%20di%20Risposta%20CCM%20SINU.pdf>.(ultimaconsultazionenovembre 2014).
- Branca F, Nikogosian H, Lobstein T. The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response.WHO; Geneva 2007. [http://www.euro.who.int/\\_data/assets/pdf\\_file/0010/74746/E90711.pdf](http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0010/74746/E90711.pdf).(ultima consultazione novembre 2014).
- Ministero della Salute, 2007 "Guadagnare salute": Italia. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4maggio 2007. Guadagnare salute. Rendere facili le scelte salutari. Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007. [http://www.ministerosalute.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_605\\_allegato.pdf](http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_605_allegato.pdf). (ultima consultazione novembre 2014).

## **Epidemiologia della situazione nutrizionale e progressione sovrappeso/obesità**

- Spinelli A, Nardone P, Buoncristiano M, Lauria L, Andreozzi S, Galeone D. (Ed.). Sistema di sorveglianza OKkio alla SALUTE: dai risultati 2012 alle azioni. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2014. (Rapporti ISTISAN 14/11).
- Lombardo FL, Spinelli A, Lazzeri G, Lamberti A, Mazzarella G, Nardone P, Pilato V, Buoncristiano M, Caroli M. Severe obesity prevalence in 8- to 9-year-old Italian children: a large population-based study. *Eur J Clin Nutr.* 2014.
- Wijnhoven T, van Raaij J M and Breda J. WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative- Implementation of round 1 (2007/2008) and round 2 (2009/2010). WHO; 2014.
- Wijnhoven TM, van Raaij JM, Sjöberg A, Eldin N, Yngve A, Kunešová M, Starc G, Rito AI, Duleva V, Hassapidou M, Martos E, Pudule I, Petrauskiene A, Sant'Angelo VF, Hovengen R, Breda J. WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative: School Nutrition Environment and Body Mass Index in Primary Schools. *Int J Environ Res Public Health.* 2014;11(11):11261-85.
- Wijnhoven TM, van Raaij JM, Spinelli A, Starc G, Hassapidou M, Spiroskil, Rutter H, Martos É, Rito AI, Hovengen R, Pérez-Farinós N, Petrauskiene A, Eldin N, Braeckvelt L, Pudule I, Kunešová M, Breda J. WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative: body mass index and level of overweight among 6-9-year-old children from school year 2007/2008 to school year 2009/2010. *BMC Public Health* 2014; 7 (14):806.
- Rossen LM, Talih M. Social determinants of disparities in weight among US children and adolescents. *Ann Epidemiol.* 2014;24(10):705-713.
- Gualdi-Russo E, Zaccagni L, Manzon VS, Masotti S, Rinaldo N, Khyatti M. Obesity and physical activity in children of immigrants. *Eur J Public Health.* 2014;24 Suppl 1:40-6.
- Lazzeri G, Giacchi MV, Spinelli A, Pammolli A, Dalmaso P, Nardone P, Lamberti A, Cavallo F. Overweight among students aged 11-15 years and its relationship with breakfast, area of residence and parents' education: results from the Italian HBSC 2010 cross-sectional study. *Nutr J.* 2014;13:69.
- Ng M, Fleming T et al. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 *Lancet.* 2014;384(9945):766-81.
- Angela Spinelli, Paola Nardone, Anna Lamberti, Marta Buoncristiano, Daniela Galeone e il gruppo OKkio alla SALUTE. *Obesità e sovrappeso nei bambini italiani: il sistema di sorveglianza "okkio alla salute". Not Ist Super Sanità* 2013;26(12):3-8.
- Bracale R, Milani L, Ferrara E, Balzaretto C, Valerio A, Russo V, Nisoli E, Carruba MO. Childhood obesity, overweight and underweight: a study in primary schools in Milan. *Eat Weight Disord.* 2013;18(2):183-91.
- Wijnhoven TM, van Raaij JM, Spinelli A, Rito AI, Hovengen R, Kunesova M, Starc G, Rutter H, Sjöberg A, Petrauskiene A, O'Dwyer U, Petrova S, Farrugia Sant'angelo V, Wauters M, Yngve A, Rubana IM, Breda J. WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative 2008: weight, height and body mass index in 6-9-year-old children. *Pediatr Obes.* 2012.
- Spinelli A, Lamberti A, Nardone P, Andreozzi S, Galeone D. (Ed.). Sistema di sorveglianza OKkio alla SALUTE: risultati 2010. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2012. (Rapporti ISTISAN 12/14).
- Binkin N, Fontana G, Lamberti A, Cattaneo C, Baglio G, Perra A, Spinelli A. A national survey of the prevalence of childhood overweight and obesity in Italy. *Obes Rev.* 2010;11(1):2-10.

## **Metodo di studio**

- Sullivan K KW, Chen M, Frerichs R. CSAMPLE: analyzing data from complex surveys samples. Epi Info, version 6, User's guide. 2007. p. 157-81.
- Borgers N. et al. Childrens as respondents in survey research: cognitive development and response quality. Bulletin de Méthodologie Sociologique 2000;66:60-75.
- Bennett S. et al. A simplified general method for cluster-sample surveys of health in developing countries. World Health Stat Q. 1991;44:98-106.

## **IMC: curve di riferimento e studi progressi**

- Cacciari E, Milani S, Balsamo A, et al. Italian cross-sectional growth charts for height, weight and BMI (2 to 20 yr). J. Endocrinol. Invest. 2014;29(7):581-593.
- Gonzalez-Casanova I, Sarmiento OL, Gazmararian JA, Cunningham SA, Martorell R, Pratt M, Stein AD. Comparing three body mass index classification systems to assess overweight and obesity in children and adolescents. Rev Panam Salud Publica. 2013;33(5):349-55.
- de Onis M, Martínez-Costa C, Núñez F, Nguéfac-Tsague G, Montal A, Brines J. Association between WHO cut-offs for childhood overweight and obesity and cardiometabolic risk. Public Health Nutr. 2013;16(4):625-30.
- Cole TJ, Lobstein T. Extended international (IOTF) body mass index cut-offs for thinness, overweight and obesity. Pediatric Obesity 2012; 7:284–294.
- Rolland-Cachera MF. Towards a simplified definition of childhood obesity? A focus on the extended IOTF references. Pediatr. Obes. 2012;7(4):259-60.
- de Onis M, Onyango A, Borghi E, Siyam A, Blössner M, Lutter C. Worldwide implementation of the WHO Child Growth Standards. Public Health Nutr. 2012;15(9):1603-10.
- Katzmarzyk PT, Shen W, Baxter-Jones A, Bell JD, Butte NF, Demerath EW, Gilsanz V, Goran MI, Hirschler V, Hu HH, Maffeis C, Malina RM, Müller MJ, Pietrobelli A, Wells JC. Adiposity in children and adolescents: correlates and clinical consequences of fat stored in specific body depots. Pediatric obesity 2012;7(5):e42-61.
- Monasta L, Lobstein T, Cole TJ, Vignerová J, Cattaneo A. Defining overweight and obesity in pre-school children: IOTF reference or WHO standard? Obes Rev. 2011;12(4):295-300.
- Rolland-Cachera MF and The European Childhood Obesity Group. Childhood obesity: current definitions and recommendations for their use. International Journal of Pediatric Obesity, 2011; 6: 325–331.
- de Onis M, Lobstein T. Defining obesity risk status in the general childhood population: which cut-offs should we use? Int. J. Pediatr. Obes. 2010;5(6):458-60.
- WHO AnthroPlus for personal computers Manual: Software for assessing growth of the world's children and adolescents. Geneva: WHO, 2009.
- Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D, Jackson AA. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. BMJ 2007; 28 (335):194.
- de Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. Bulletin of the World Health Organization 2007;85:660–667.

- Kuczmarski RJ, Ogden CL, Guo SS, et al. 2000 CDC growth charts for the United States: methods and development. *Vital Health Stat* 11 2002;246:1–190.
- Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: International survey. *BMJ* 2000; 320:1240-1243.
- Dietz WH, Bellizzi MC. Introduction: the use of body mass index to assess obesity in children. *Am. J. Clin. Nutr.* 1999;70(1):123S-5S.

### **Fattori di rischio modificabili**

- Lau EY, Barr-Anderson DJ, Forthofer M, Saunders RP, Pate RR. Associations Between Home Environment and After-School Physical Activity and Sedentary Time Among 6th Grade Children. *Pediatr Exerc Sci.* 2014.
- Xiao Q, Keadle SK, Hollenbeck AR, Matthews CE. Sleep Duration and Total and Cause-Specific Mortality in a Large US Cohort: Interrelationships With Physical Activity, Sedentary Behavior, and Body Mass Index. *Am J Epidemiol.* 2014;180(10):997-1006.
- Mytton OT, Nnoaham K, Eyles H, Scarborough P, Ni Mhurchu C. Systematic review and meta-analysis of the effect of increased vegetable and fruit consumption on body weight and energy intake. *BMC Public Health.* 2014;14:886.
- Appelhans BM, Fitzpatrick SL, Li H, Cail V, Waring ME, Schneider KL, Whited MC, Busch AM, Pagoto SL. The home environment and childhood obesity in low-income households: indirect effects via sleep duration and screen time. *BMC Public Health.* 2014;14:1160.
- Tandon P, Grow HM, Couch S, Glanz K, Sallis JF, Frank LD, Saelens BE. Physical and social home environment in relation to children's overall and home-based physical activity and sedentary time. *Prev Med.* 2014;66:39-44.
- Olafsdottir S, Berg C, Eiben G, Lanfer A, Reisch L, Ahrens W, Kourides Y, Molnár D, Moreno LA, Siani A, Veidebaum T, Lissner L. Young children's screen activities, sweet drink consumption and anthropometry: results from a prospective European study. *Eur J Clin Nutr.* 2014;68(2):223-8.
- Stamatakis E, Coombs N, Jago R, Gama A, Mourão I, Nogueira H, Rosado V, Padez C. Associations between indicators of screen time and adiposity indices in Portuguese children. *Prev Med.* 2013;56(5):299-303.
- Pate RR, O'Neill JR, Liese AD, Janz KF, Granberg EM, Colabianchi N, Harsha DW, Condrasky MM, O'Neil PM, Lau EY, Taverno Ross SE. Factors associated with development of excessive fatness in children and adolescents: a review of prospective studies. *Obes Rev.* 2013;14(8):645-58.
- Morgan RE. Does consumption of high-fructose corn syrup beverages cause obesity in children? *Pediatr Obes.* 2013;8(4):249-54.
- Fakhouri TH, Hughes JP, Brody DJ, Kit BK, Ogden CL. Physical activity and screen-time viewing among elementary school-aged children in the United States from 2009 to 2010. *JAMA Pediatr.* 2013;167(3):223-9.
- TeMorenga L, Mallard S, Mann J. Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials and cohort studies. *BMJ.* 2012;346:e7492.
- Davis CL, Pollock NK, Waller JL, Allison JD, Dennis BA, Bassali R, Meléndez A, Boyle CA, Gower BA. Exercise dose and diabetes risk in overweight and obese children: a randomized controlled trial. *JAMA* 2012;308(11):1103-12.

- Censi L, D'Addesa D, Galeone D, Androzzini S, Spinelli A (Ed.). Studio ZOOM8: l'alimentazione e l'attività fisica dei bambini della scuola primaria. Roma: IstitutoSuperiore di Sanità; 2012. (Rapporti ISTISAN 12/42).
- Hooper L, Abdelhamid A, Moore HJ, Douthwaite W, Skeaff CM, Summerbell CD. Effect of reducing total fat intake on body weight: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials and cohort studies. *BMJ*. 2012;345:e7666.
- Kral TV, Rauh EM. Eating behaviors of children in the context of their family environment. *PhysiolBehav*. 2010;100(5):567-73.

### **Interventi e linee guida per l'azione**

- Martin A, Saunders DH, Shenkin SD, Sproule J. Lifestyle intervention for improving school achievement in overweight or obese children and adolescents. *Cochrane Database Syst Rev*. 2014 Mar 14;3:CD009728.
- Kovács E, Siani A, Konstabel K, Hadjigeorgiou C, de Bourdeaudhuij I, Eiben G, Lissner L, Gwozdz W, Reisch L, Pala V, Moreno LA, Pigeot I, Pohlmann H, Ahrens W, Molnár D; IDEFICS consortium. Adherence to the obesity-related lifestyle intervention targets in the IDEFICS study. *Int J Obes (Lond)*. 2014;38 Suppl 2:S144-51.
- Guerra PH, Nobre MR, da Silveira JA, Taddei JA. School-based physical activity and nutritional education interventions on body mass index: a meta-analysis of randomised community trials - project PANE. *Prev Med*. 2014;61:81-9.
- Dobbins M, Husson H, DeCorby K, LaRocca RL. School-based physical activity programs for promoting physical activity and fitness in children and adolescents aged 6 to 18. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013.
- Fairclough SJ, Hackett AF, Davies IG, Gobbi R, Mackintosh KA, Warburton GL, Stratton G, van Sluijs EM, Boddy LM. Promoting healthy weight in primary school children through physical activity and nutrition education: a pragmatic evaluation of the CHANGE! randomised intervention study. *BMC Public Health*. 2013;13:626.
- Moss A, Smith S, Null D, Long Roth S, Tragoudas U. Farm to School and Nutrition Education: Positively Affecting Elementary School-Aged Children's Nutrition Knowledge and Consumption Behavior. *Child Obes*. 2013;9(1):51-6.
- Silveira JA, Taddei JA, Guerra PH, Nobre MR. The effect of participation in school-based nutrition education interventions on body mass index: a meta-analysis of randomized controlled community trials. *Prev Med*. 2013;56(3-4):237-43.
- Wright K, Giger JN, Norris K, Suro Z. Impact of a nurse-directed, coordinated school health program to enhance physical activity behaviors and reduce body mass index among minority children: a parallel-group, randomized control trial. *Int J Nurs Stud*. 2013;50(6):727-37.
- Mostafavi R, Ziaee V, Akbari H, Haji-Hosseini S. The Effects of SPARK Physical Education Program on Fundamental Motor Skills in 4-6 Year-Old Children. *Iran J Pediatr*. 2013;23(2):216-9.
- Breslin G, Brennan D, Rafferty R, Gallagher AM, Hanna D. The effect of a healthy lifestyle programme on 8-9 year olds from social disadvantage. *Arch Dis Child*. 2012;97(7):618-24.
- van Grieken A, Ezendam NP, Paulis WD, van der Wouden JC, Raat H. Primary prevention of overweight in children and adolescents: a meta-analysis of the effectiveness of interventions aiming to decrease sedentary behaviour. *Int J BehavNutrPhys Act*. 2012 28;9:61.

- ▼ Brandstetter S, Klenk J, Berg S, Galm C, Fritz M, Peter R, Prokopchuk D, Steiner RP, Wartha O, Steinacker J, Wabitsch M. Overweight prevention implemented by primary school teachers: a randomised controlled trial. *Obes Facts*. 2012;5(1):1-11.
- ▼ Hendrie GA, Brindal E, Corsini N, Gardner C, Baird D, Golley RK. Combined home and school obesity prevention interventions for children: what behavior change strategies and intervention characteristics are associated with effectiveness? *Health EducBehav*. 2012;39(2):159-71.
- ▼ Centers for Disease Control and Prevention (CDC). School health guidelines to promote healthy eating and physical activity. *MMWR Recomm Rep*. 2011;60(RR-5):1-76.
- ▼ Plachta-Danielzik S, Landsberg B, Lange D, Langnäse K, Müller MJ. [15 years of the Kiel Obesity Prevention Study (KOPS). Results and its importance for obesity prevention in children and adolescents]. *BundesgesundheitsblattGesundheitsforschungGesundheitsschutz*. 2011;54(3):304-12.
- ▼ Van Cauwenberghe E, Maes L, Spittaels H, van Lenthe FJ, Brug J, Oppert JM, De Bourdeaudhuij I. Effectiveness of school-based interventions in Europe to promote healthy nutrition in children and adolescents: systematic review of published and 'grey' literature. *Br J Nutr*. 2010;103(6):781-97.
- ▼ Taylor RW, McAuley KA, Barbezat W, Strong A, Williams SM, Mann JI. APPLE Project: 2-y findings of a community-based obesity prevention program in primary school age children. *Am J ClinNutr*. 2007;86(3):735-42.

