

SIFILID - SIFILIDE

Sifilidi është një sëmundje ngjitëse e shkaktuar nga një bakter i quajtur *Treponema pallidum*. Sifilidi është një infeksion shumë serioz që shpërndahet në të gjithë trupin dhe në qoftë se nuk kurohet mund të shkaktojë kardiopati, çmenduri, verberi, paraliz dhe vdekje. Sifilidi merret me ngjitjen direkte seksuale (seks vaginal, në pasdalje ose në gojë) me individ të infektuar (sifilid i marrur), por mund të transmetohet nga një nënë e infektuar në fetus (sifilid i lindur).

Sifilidi i lindur mund të shkaktojë vdekjen e fetusit në 40% e rasteve ose lindjen e femijëve të sëmurë të prekur nga verberija dhe të tjera dëmtime të rënda në organe.

Infektimi i sifilidit mund të rrisë rrezikun e infektimit nga HIV, virusi që shkakton AIDS.

SI SHFAQET SËMUNDJA

Simptomi i parë i sifilidit është zakonisht një ulçerë, një plagë e vogël e padhembshme (sifilom) në zonën e kontaktit seksual (penis, vagjin, pasdalje, gojë), e shoqëruar me një enjtje e limfonodave afër. Plaga zakonisht shfaqet 2-6 javë pas ngjitjes dhe zhduket brenda pak javësh.

Faza që vjen pas është e karakterizuar nga temperatura, ekzanteme të përgjithshme dhe enjtje në gjendrat limfatike në të gjithë trupin (fazë e dytë). Edhe këto lëndime zhduken në mënyrë të natyrshme në 20 – 70 ditë pa lere asnjë shenjë. Në rast mungese të mjekimeve, pas disa muajve, ose viteve, shfaqet sifilidi i tretë. Në këtë fazë janë të prekur lekura, sistemi kardiovaskular dhe sistemi nervor, por të gjithë organet dhe aparatet mund të përfshihen.

CFARE DUHET TË BEHET PËR TË DITUR SE JE I INFEKTUAR

Është e mundur të bëhet një test sierologjik (marrje e gjakut) që mund të diagnostikojë infektimin edhe kur mungojnë simtomet. Kjo analizë bëhet normalisht në të gjithë gratë në shtatzëni gjatë 3 muajve të parë.

Sifilidi mund të diagnostikohet edhe me analizen në mikroskop të një kampioni të plagës.

CFARE DUHET TË BEHET PËR TË PARANDALUAR SËMUNDJEN

- parandalimi i sifilidit bazohet në adoptimin e sjelljeve të korrekta: të përmbahet numri i partnerve seksual dhe të përdoret preservativi, në mënyrë të vecantë në raporte të rastësishme,
- në rast infektimi, të shmangen kontaktet seksuale deri në shërim të plotë dhe të sigurohet që partneret tuaj marrin mjekimet për të shmangur një infektim tjetër,

- ne qofte se je ne shtatzeni drejtohu gjinekologut qe te bej testin sierologjik te zakonshem: **parandalimi dhe diagnostikimi i infektimit i sifilidit te lindur varen edhe nga diagnostikimi i infektimit ne kohen e duhur ne nenen e ardhshme.** Ne qofte se gjate shtatzenise ke raporte te pa mbrojtura me partner te ri, mos ngurro te perseritesh analizen dhe kujtohu te perdoresh prezervativin.

I azhurnuar ne Qeshor 2003 / Aggiornato al Giugno 2003

I perkthyer nga Kooperativa INTEGRA / Tradotto da Cooperativa INTEGRA

Me kontibutin e Provinces se Modena / Con il contributo della Provincia di Modena

Per te ditur me teper drejtohuni ne:

Per saperne di più rivolgersi a: