COS'È LO SCREENING?

Lo sviluppo di un tumore del colon retto è quasi sempre preceduto dalla comparsa di lesioni benigne dell'intestino (polipi o adenomi).
Lo screening per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore del colon retto serve a individuare queste lesioni pre tumorali, in modo da intervenire in tempo con trattamenti efficaci.
La fascia di età dello screening è stata estesa oltre i 69 anni per rivolgersi gradualmente a tutte le persone di età compresa tra i 50 e i 74 anni.

VUOI PIÙ INFORMAZIONI?

Vieni a trovarci online

regioneer.it/colon

oppure chiamaci al numero verde

800 033 033

tutti i giorni feriali dalle 8.30 alle 18.00
e il sabato dalle 8.30 alle 13.00

RegioneEmilia-Romagna

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

RegioneEmilia-Romagna

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

È SEMPLICE, GRATUITO E PUÒ SALVARE LA VITA.

LO SCREENING PUÒ SALVARTI LA VITA!

Lo screening è semplice, gratuito e funziona, perché se la malattia è scoperta in fase iniziale, è più probabile ottenere una guarigione completa.
Il tumore del colon retto è:

IL 2° PIÙ DIAGNOSTICATO
IL 2° PER MORTALITÀ NELLA POLAZIONE ITALIANA

Per chi partecipa regolarmente allo screening per il tumore del colon retto, diminuiscono mortalità e diagnosi.

MORTALITÀ
-65% negli uomini
-54% nelle donne

DIAGNOSI DI TUMORE
-33% negli uomini
-21% nelle donne

COME SI FA

Lo screening consiste nella ricerca di sangue occulto nelle feci tramite un prelievo da fare in completa autonomia nella propria abitazione.

1. **RITIRA IL KIT** NEL LUOGO INDICATO NELLA LETTERA

2. **LEGGI LE ISTRUZIONI**
3. **RACCOGLI UN CAMPIONE DI FECI** CON L'APPOSITO BASTONCINO

4. **CONSEGNA IL CAMPIONE** AL CENTRO DI RACCOLTA INDICATO NELLA LETTERA
5. **IL RISULTATO** TI SARÀ INVIATO A CASA O SUL FSE

OGNI DUE ANNI RICEVERAI L'INVITO A RIFARE LO SCREENING

È importante ripeterlo, anche se stai bene, perché spesso polipi e tumori non danno disturbi per anni.

E SE IL TEST RISULTA POSITIVO?

La presenza di sangue occulto nelle feci non significa automaticamente presenza di polipo o di lesione tumorale.
Il sanguinamento può essere dovuto anche ad altre cause, come ragadi, emorroidi o diverticoli.
Per questo se il test è positivo, è importante aderire all'accertamento con colonscopia proposto.