



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA



Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento Interaziendale ad Attività Integrata “ Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica”  
Direttore dr. Tommaso Trenti

## GLICOSURIA FRAZIONATA

Raccolta delle urine emesse tra i pasti principali (colazione, pranzo, cena) per la determinazione della eventuale presenza di glucosio.

Le determinazioni si effettuano su tre campioni nell'arco complessivo di una giornata e a tempi standard:

I CAMPIONE : raccolta delle urine emesse tra la colazione e il pranzo  
(es. ore 8-12)

II CAMPIONE : raccolta delle urine emesse tra il pranzo e la cena  
(es. ore 12-20)

III CAMPIONE : raccolta delle urine emesse tra la cena e la colazione  
(es. ore 20-8)

### INVIO AL LABORATORIO:

Inviare in laboratorio una aliquota di ciascun campione con indicazione dell'intervallo di tempo della raccolta e della quantità.

Tra una raccolta e l'altra i campioni vengono conservati in frigorifero per poi essere consegnati insieme in laboratorio

**Allegati al promemoria: 3 PROVETTE URINE TAPPO MARRONE**

aggiornamento del 18 novembre 2016